





## ATLAS

DER

# DIATOMACEEN-KUNDE.

HERAUSGEGEBEN

VON

## ADOLF SCHMIDT,

ARCHIDIACONUS IN ASCHERSLEBEN.

BRARY FW YORK BOLASICAL GALUEN

Serie II. Tafel 49-96.



LIBRARY NEW YORK HOTANICAL HARDEN

LEIPZIG.

O. R. REISLAND.

FOK 569 : C7 A84 Heft 13-24





## ATLAS

DER

# DIATOMACEEN-KUNDE.

IN VERBINDUNG MIT DEN HERREN

GRÜNDLER, GRUNOW, JANISCH, WEISSFLOG und WITT.

No 13
49 Mavicula
50 Do

HERAUSGEGEBEN

VON

y dampylodiscu

ADOLF SCHMIDT,

ARCHIDIACONUS IN ASCHERSLEBEN.

DREIZEHNTES HEFT.

13


ASCHERSLEBEN,

VERLAG VON ERNST SCHLEGEL.

1877.







### Vorläufige Erläuterungen

## A. Schmidt's Atlas der Diatomaceenkunde Heft 13.

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 660jach vergrössert.



Ausgegeben am 15. August 1877.

Berichtigung der Erläuterungen zu Heft 5. u. 12.

T. 17. f. 7. Campylodiscus Horologium var. mediterranea Grunow.

T. 47. f. 25. 26. 1. Tents Muir.

LIBRARY DEW LONG BULAND GARDES

#### Taf. 49.

F. 1.—42. Gruppe der Navicula firma; die charakteristischen Merkmale, namlich 1, die nach verschiedenen Seiten abgebogenen Mittelporen, 2, die mehr oder weniger schief stehenden, vor dem Rande von einer oder mehreren Längslinien unterbrochenen, Querriefen, sind deutlich nur an den grösseren Formen wahrzunehmen; die Formgebiete der Arten lassen sich noch nicht begrenzen.

- 1. Monticello, N. York, fraglich, ähnlich der viel kleineren N. columnaris E.
- Monticello, Navicula Iridis E.
- Blackmost, N. firma K. Holstein, 5. Degernäs, N. ampliata E. ? 4.

- Pudasjärri, N. dilatata E.
  Tents Muir, S. Bautzen, vielleicht N. dubia (E.?) Gregory.
  Monmouth, Maine, N. dilatata E.
  Cherryfield, Maine, N. (firma var.) tumescens Grunow, nach meiner Ansicht nicht mit N. firma zu vereinigen.
- Puertho Montt, N. dubia Greg.
- Demerara R., N. cilrea A. S.
- Loch Dawin, Scotl., fraglich.
- Whatabevot, viell. Altersverkümmerung v. N. firma. Pudasjärri, 17. Norrland, N. bisulcata Lagerstedt.
- Sing-Sing, Hudson R., N. firma var. subundulata Grunow. Sodanskylae, nach Grunow Mittelform zwischen N. firma u. N. bisulcata.
- 19. Loch Cammore, N. firma var. subampliata Grunow. 20. 23. Loka, 21. St. Fiore, 22. Blackmost, N. affinis E. & varr.

- 24. Rügenwalde, N. dubia Gregory N. Peisonis Grunow. 25. 26. Artern, Varietät derselben ; auch N. Peisonis kommt schwach eingeschnürt vo
- 27. Edinburgh, 28. Bautzen, 29. Pearley's Meadow, N. amphi-
- rhynchus E.

  Loka, Mittelform zwischen N. amphirhynchus u. N. affinis.
- 31. Blackmost, N. amphigomphus E. var. ?
  32. 34. North Providence, 33. Saco Pond, N. amphigomphus E.
  35. Sodanskylae, 36. Blackmost, N. Hitchcockii E.
  37. Quartscheck, 38. Winningen, 39. Loka, N. producta W. Sm.

- 40. Lake Moram, fraglich. 41. 42. Demerara R. N. oblique striata A. S.
- F. 43.—53. Gruppe der N. sphaerophora. Södertelge, 44. Franzensbad, N. bohemica E. 43.
- 45. Kunsee, N. bohemica var.
- 46,-48. Franzensbad, N. sulpta E.
- Winningen, 50, Ringkjöbing, 51, Södertelge, N. sphaerophora K.
- Franzensbad, N. biceps E.
- Kunsee, fraglich; nach Grunow wahrscheinlich dieselbe,

#### Taf. 50.

- Samoa (2. nur 330 : 1), Navicula robusta Grunow.
- Whatabevot, N. sectilis A. S.
- 5. Porto Seguro, sp. n. von Kitton zu benennen. Mazatlan, 7. N. Celebes, nach Grunow "N. (maxima var. ?) excentrica Grunow, forma curta".

  Neuse R., 9. Don Mouth, Scotl. 10. Darien, 11. Raised March,
- N. formosa varr.
- Hull Inlet, N. formosa Gregory. Cuxhaven, 14. Salt Lake, Utah, mit N. formosa verwandte 13. Formen.
- Darien (Gründler), fraglich.
- 16.-18. Cresswell, N. Liber W. Sm. (durch die eigenthümlichen Endporen gegen alle verwandten Formen abgegrenzt
- 19. Sandw. Ins., 20. 21. Mazatlan, ob zu N. maxima Gregory zu ziehen?

- 22, 24. Samoa, 23, 25. Baltschik, N. Bleischii Janisch, nahe verwandt mit N. excentrica Grunow.

- 26. Demerara R., sp. n. ? 27.—29. Yokohama, N. elongata Grunow, 30. Yokohama, N. delata A. S. (Nordsee Diat. II, 43.).
- 30. Yokohama. N. 31. Kiel, fraglich.
- 32. 33. Hvidingsoe, N. maxima var. umbilicata Grunow.
  34. 35. Kings Mill L. fragliche Formen; man beachte wohl die eigenthümlichen Endporen von F. 35.
- Sorrent, N. maxima var. ?
- Sandw. I., N. maxima var. = N. bicuneata Grunow. G. v. Mexico, N. linearis Grunow.
- 39. Yokohama, sp. n.
- Valparaiso, fraglich. Baltschik, desgl. Demerara R., desgl. 40.
- 41.

43. 44. Samoa, N. Samoensis Grunow.

Singapore, sp. n. ? Camp. Bai (Gründl.), N. probabilis A. S. Cherryfield, mit N. producta verwandt? 48. Oregon, fraglich; auch mit dem Condensor war keine Punktirung der Riefen zu bemerken.

Camp. Bai, fraglich. Oregon, N. hexapla A. S. 49. 50.

## Taf. 51.

Sandw. I., cf. Atlas, 16, 2. Campylodiscus taeniatus A. S. Rothes Meer (Grunow), C. ornatus var. amphileia Grunow. Südaustralien (Grunow), C. ornatus var. mesoleia Grunow.; scheint besondere Species zu sein.

Nicobaren, fragliches Bruchstück.

Camp. Bai (Gründl.), C. adornatus A. S.

Samoa (Grunow), C. ornatus Grev. var.

C. Horologium Williams. O. E. (Darum ist T. 17 F. 7 als C. Horologium var. mediterranea Grunow aufzuführen, nicht als besondere Species).

Samoa, C. notatus var. Vitiensis Grunow.

Rockingham, N. Australien, C. australis Grunow var.

Grunow, O. E. (mit C. Grunow verwandt.
Cap d. g. H., 12. Baltschik, fraglich.
Camp. Bai, C. Gründleri Grunow.
Samoa, C. ambiguus var. Upolensis Grunow, O. E.
Nordsee, C. Thuretii Bréb.
-21. Baltschik C. Thuretii Balearen, C. impressus Grunow, O. E. (mit C. Lorenzia nus

11.

13.

14.

16.-21. Baltschik, C. Thuretii var. Baldjikiana Grunow.

### Taf. 52.

- 1. 2. St. Brieue (Gründl.), Campylodiscus eximius Grev. var. Briocensis, (F. 2. nach Grunow's Ansicht C. Hodgsonii W. Sm. var.).
- Camp. Bai (Gründl.), C. adornatus A. S.
   Camp. Bai, cf. Atlas, 17, 18. C. tabulatus A. S.
- Successful Bai, Kerguelen, C. Schleinitzii Janisch. Camp. Bai, C. Sauerbeckii Gründler, O. E.
- Camp. Bai, nach Janisch der echte C. imperialis Greville, nach Grunow nicht ganz dessen Form.
- Camp. Bai (Gründl.), C. bifurcatus A. S.

## A. Schmidt's

# Atlas der Diatomaceenkunde

### Tafel 49

(Ausgegeben am 15, August 1877.)


EWY ODE

CHROCK

### Verbesserter Abdruck.

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigejägt ist, sind die Abbildungen durchweg 660fach vergrossert.

Ausgegeben am 1. August 1886.



F. 1.—42. Gruppe der Navicula firma; die charakteristischen Merkmale, nämlich 1, die nach verschiedenen Seiten abgebogenen Mittelporen, 2, die mehr oder weniger schief stehenden, vor dem Runde von einer oder mehreren Langslinien unter brochenen, Querriefen, sind deutlich nur an den grosseren Formen wahrzunehmen; die Formgebiete der Arten lassen sich noch

Monticello, N. York, fraglich, ähnlich der viel kleineren N. columnaris E.
 Monticello. Navicula Iridis E.

2. Monticello. Navicula Iridis E.
3. Blackmost, N. firma K.
4. Holstein, 5. Degernas, N. ampliata E.?
6. Pudasjärri, N. dilatata E.
7. Tents Muir, 8. Bautzen, vielleicht N. dubia (E.?) Gregory.
9. Monmouth, Maine, N. dilatata E.
10. Cherryfield, Maine, N. (firma var.) tumescens Grunow, much meiner Ansicht nicht mit N. firma zu vereinigen.
11. Puerto Montt, N. dubia Greg.
12. Demerara R., N. citrea A. S.
13. Loch Dawin, Scotl., fraglich.
14. Whatabevot, viell. Altersverkummerung v. N. firma.
15. Pudasjärri. 17. Norrland, N. bisulcata Lagerstedt.
16. Sing-Sing, Hudson R, N. firma var. subundulata Grunow.
17. Sodanskylae, nach Grunow Mittelform zwischen N. firma und N. bisulcata
19. Loch Canmore, N. firma var. subampliata Grunow.

19. Loch Canmore, N. firma var. subampliata Grunow. 20.23. Loka, 21. St. Fiore, 22. Blackmost, N. affinis E. & varr.

24. Rügenwalde, N. dubia Gregory = N. Peisonis Grunow.
25.26. Artern, Varietät derselben; auch N. Peisonis kommt schwach eingeschnurt vor.
27. Edinburgh, 28. Bautzen, 29. Pearley's Meadow, N. amphirhynchus E.
30. Loka, Mittelform zwischen N. amphirhynchus u. N. affinis.

31. Blackmost, N. amphigomphus E. var. ?
32,34. North Providence, 33. Saco Pond, N. amphigomphus E.
35. Sodanskylae, 36. Blackmost, N. Hitchcockii E.
37. Quartscheck, 38. Winningen, 39. Loka, N. producta W. Sm.

40. Lake Moram, fraglich. 41.42. Demerara R. N. oblique striata A. S.

F. 43.—53. Gruppe der N. sphaerophora.

43. Sodertelge, 44. Franzensbad, N. bohemica E. 45. Kunsee, N. bohemica var.

46.-48. Franzensbad, N. sculpta E.

49. Winningen, 50. Ringkjöbing, 51. Södertelge, N. sphaerophora K. 52. Franzensbad, N. biceps E.

53. Kunsee, fraglich; nach Grunow wahrscheinlich dieselbe.



yez. v. A. S.



## A. Schmidt's

## Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 50

(Ausgegehen am 15. August 1877.)

#### Verbesserter Abdruck.

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 660 ach vergrössert.

Ausgegeben am 1. August 1886.



- 1.2. Samoa (2. 330 : 1), Navicula robusta Grunow.
- 3. Whatabevot, N. sectilis A. S.

- 3. Whatabevot, N. sectilis A. S.

  4.5. Porto Seguro, sp. n. von Kitton zu benennen.

  6. Mazatlan, 7. N. Celebes, nach Grunow "N. (maxima var.?) excentrica Grunow, forma curta."

  8. Neuse R., 9 Don Mouth, Scotl., 10. Darien, 11. Raised March, N. formosa varr.

  12. Hull Inlet, N. formosa Gregory.

  13. Cuxhaven. 14. Salt Lake, Utah, mit N. formosa verwandte Formen.

  15. Darien (Gründler), fraglich.

  16.—18. Cresswell, N. Liber W. Sm. (durch die eigenthümlichen Endporen gegen alle verwandten Formen abgegrenzt).

  19. Sandw. Ins., 20.21. Mazatlan, ob zu N. maxima Gregory zu ziehen?

  22.24. Samoa, 23.25. Baltschik, N. Bleischii Janisch, nahe verwandt mit N. excentrica Grunow.

  26. Demerara R., sp. n.?

  27.—29. Yokohama, N. elongata Grunow.

  30. Yokohama, N. elongata Grunow.

  31. Kiel, fraglich.

  32.33. Hvidingsoe, N. maxima var. nmbilicata Grunow.

  34.35. Kings Mill I., fragliche Formen; man beachte wohl die eigenthumlichen Endporen von F. 35.

  36. Sorrent, N. maxima var.?

  27. Sandw. I., N. maxima var. = N. bicuneata Grunow.

  38. G. v. Mexico, N. linearis Grunow.


  39. Yokohama sp. n.?

  40. Valparaiso, fraglich.

- 40. Valparaiso, fraglich.
  41. Baltschik, desgl.
  42. Demerara R., desgl.
  43.44. Samoa, N. Samoensis Grunow.

- 45.44. Samoa, N. Samoensis urunuw.
  45. Singapore, sp. n.?
  46. Camp. Bai (Gründl.), N. probabilis A. S.
  47. Cherryfield, mit N. producta verwandt?
  48. Oregon, fraglich; auch mit dem Condensor war keine Punkturung der Riefen zu bemerken.
  49. Camp. Bai, fraglich.
  50. Oregon, N. hexapla A. S.







### A. Schmidt's

## Atlas der Diatomaceenkunde

### Tafel 51

(Ausgegeben am 15. August 1877.,

#### Verbesserter Abdruck.

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefägt ist, sind die Abbildungen durchweg 660pach vergrossert.

Ausgegeben am 1. August 1886.



Sandw. I., cf. Atlas 16, 2. Campylodiscus taeniatus A. S.
 Rothes Meer (Grunow), C. ornatus var. amphileia Grunow.
 Südaustralien (Grunow), C. ornatus var. mesoleia Grunow.; scheint besondere Species zu sein.

4. Nicobaren, fragliches Bruchstück.
5. Camp. Bai (Gründl.), C. adornatus A. S.
6. Samoa (Grunow), C. ornatus Grev. var.
7. C. Horologium Williams. O. E. (Darum ist T. 17 F. 7 als C. Horologium var. mediterranea Grunow aufzufuhren, nicht als besondere Species).

sondere Species).

8. Samoa, C. notatus var. Vitiensis Grunow.

9. Rockingham, N. Australien, C. australis Grunow var.

10. Balearen, C. impressus Grunow, O. E. (mit C. Lorenzianus Grunow verwandt.

11. Cap d. g. H., 12. Baltschik, fraglich.


13. Camp. Bai, C. Gründleri Grunow.

14. Samoa, C. ambiguus var Unglensis Grunow () E.

14. Samoa, C. ambiguus var. Upolensis Grunow, O. E. 15. Nordsee, C. Thuretii Bréb.

16.-21. Baltschik, C. Thuretii var. Baldjikiana Grunow.







ZU

### A. Schmidt's

## Atlas der Diatomaceenkunde


#### Tafel 52

(Ausgegehen am 15. August 1877.)


#### Verbesserter Abdruck.


Wo keine besondere Angube der Vergrosserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 650 jach vergrossert.


Ausgegeben am 1. August 1886.



- 1.2. St. Brieuc (Gründl.), Campylediscus eximius Grev. var. Briecensis, (F. 2. nach Grunow's Ansicht C. Hodgsonii W. Sm. var., 3. Camp. Bai (Gründl.), C. adornatus A. S. 4. Camp. Bai, cf. Atlas, 17, 18. C. tabulatus A. S. 5. Successful Bai, Kerguelen, C. Schleinitzii Janisch. 6. Camp. Bai, C. Sauerbeckii Gründler, O. E. 7. Camp. Bai, nach Janisch der echte C. imperialis Greville, nach Grunow nicht ganz dessen Form. 8. Camp. Bai (Gründl.), C. bifurcatus A. S.









## ATLAS

DER

# DIATOMACEEN-KUNDE.

IN VERBINDUNG MIT DEN HERREN

GRÜNDLER, GRUNOW, JANISCH, WEISSFLOG und WITT.

53, dambuladiscus

HERAUSGEGEBEN

VON

## ADOLF SCHMIDT,

ARCHIDIACONUS IN ASCHERSLEBEN.

VIERZEHNTES HEFT.

ASCHERSLEBEN,

VERLAG VON ERNST SCHLEGEL.

1877







## Vorläufige Erläuterungen

## A. Schmidt's Atlas der Diatomaceenkunde Heft 14.

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 660fach vergrössert.

Ausgegeben am 15. August 1877.

#### Taf. 53.

1. 2. Baltschik, Campylodiscus striolatus Grunow.

4. Camp. Bai, C. Sauerbeckii Gründler.
Camp. Bai, nach Janisch C. Hodgsonii W. Sm., wogegen
Grunow geltend macht, dass C. Hodgsonii,
den er übrigens noch nie gesehen habe,
engere Rippen (7 auf 1/100") haben müsse;

nach Grunow C. imperialis Grev. var. Puerto Cabello, C. imperialis Grev. var.

Camp. Bai, nach Janisch C. imperialis Grev. nach Grunow nur dessen Var.; F. 7 vermag ich nicht mit F. 5. 6. zu vereinigen!

Camp. Bai, fraglich.

Camp. Bai, fragiten.

Camp. Bai, C. concinnus Grev. var. lineata Grunow, im Rande jedoch sehr verschieden von T. 18. F. 16.; nach Janisch C. Hodgsonii var.; könnte als solcher aber auch mit F. 5. nicht vereinigt werden.

Camp. Bai (Janisch), C. Schmidtii Grunow var. cf. T. 15. F. 12. Balearen (Grunow), C. Balearicus Cleve. Honduras, C. Rabenhorstii Janisch var.  $\beta$ . O. E. Honduras, C. Rabenhorstii Janisch var.  $\alpha$ . O. E. Balearicus C. Balearicus Ianisch var.  $\alpha$ . O. E.

11. 12.

13.

Honduras, C. Rabenhorstii Janisch var. (= C. Ecclesianus Grev. var.; Janisch's Benennung hat jedoch die Prioritat).

15. Samoa, C. notatus var. Vitiensis Grunow, forma minor. O. E. 16. 17. Camp. Bai, C. Phalangium A. S.

18. S. Thomas (Grunow), nach Grunow C. crebrestriatus Grev., forma minor.

Rothes Meer, C. Heufleri Grunow cf. T. 14 F. 25, 26.

Camp. Bai, C. Rotula Grunow, genau nach einem besonders grossen u. schönen Ex. cf. T. 14. F. 10.

#### Taf. 54.

1. 2. Yarra Yarra, Campylodiscus Daemelianus Grunow.

Kristianstadt, Schwed., C. Echenëis E.
 Kristianstadt, C. Clypeus E.

#### Taf. 55.

1. Kristianstadt, 2. Breydon (beide 300 : 1), 3. Franzensbad (660 : 1), Campylodiscus Clypeus E.

Kristianstadt, 6. salz. See b. Eisleben, C. bicostatus W. Sm.

Rothes Meer, C. bicostatus var. arabica Grunow. O. E.

Rammer Moor, C. noricus E.

9. Sardinien, 10. 11. Strehlen, 12. 13. Quartscheck, 14.—16. Kristianstadt, C. hibernicus E. = C. costatus W. Sm. (Nach Grunow's Ansicht kann C. noricus wegen seiner enger gestellten Rippen von C. hibernicus einstweilen noch getrennt werden).

### Taf. 56.

1. Moron, Surirella Neumeyeri Janisch, O. E. (oder Plagiodiscus Neum., denn Plagiodiscus ist nichts anderes, als eine nierenförmige Surirella).

Auklands I., S. contorta Kitton O. E.

3. 4. Gazellen Exp., ohne Fundort, 5. Leton Bank, S. iaxa Janisch, (mit S. lata zwar verwandt, aber durchaus nicht mit ihr zu verbinden).

Gaz. Exp., fraglich.

Balearen, S. fastuosa var. punctata Grunow, sich nach des Autors Ansicht seiner S. intercedens nähernd.

Jamaica (Kitton), fraglich.

Leton Bank, S. manca Janisch, O. E. Samoa, 11. Gaz. Exp., S. patens A. S. varr.?

12. Grip, Norweg., fraglich.
13. 14. Duck Pond, Waterford, Maine (14. c. 980/1), S. arctissima A. S.

15. 16. Pensacola, S. cruciata A. S.

17.—19. O. E. von S. Brightwellii W. Sm. cf. T. 24. F. 6. ncben diesen keine mit S. Crumena zu verbindende Form!!

20. Darien, nach Grunow ähnlich seiner S. ovalis var. Kotschyana vom Kunsee.

21. 22. Pensacola, 23. Lodgie Coldstone, Scotl., S. Mölleriana Grunow.

 Kerguelen, Foundery Branch, S. Kerguelensis Grunow.
 26. Warrington, S. spiralis K. (Diese kann durchaus nur zu Surirella gestellt werden, denn die Mittellinien ihrer beiden Schalen verlaufen parallel; die Mittellinien der Campylodiscus-Schalen stehen vertical gegen einander.)



### A. Schmidt's

# Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 53

(Ausgegeben am 15. October 1878.)

#### Verbesserter Abdruck.

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 660/ach vergrössert.

Ausgegeben am 1. November 1886.



- 2. Baltschik, Campylodiscus striolatus Grunow.
   4. Camp. Bai, C. Sauerbeckii Gründler.
   5. Camp. Bai, nach Janisch C. Hodgsonii W. Sm., wogegen Grunow geltend macht, dass C. Hodgsonii, den er übrigens noch nie gesehen habe, engere Rippen (7 auf 1/100") haben müsse; nach Grunow C. imperialis Grev. var. Puerto Cabello, C. imperialis Grev. var.
  Camp. Bai, nach Janisch C. imperialis Grev. nach Grunow nur dessen Var.; F. 7. vermag ich nicht mit F. 5. 6. zu vereinigen!

- Camp. Bai, 1. agrich.


  Camp. Bai, C. concinnus Grev. var. lineata Grunow, im Rande jedoch sehr verschieden von T. 18, F. 16.; nach Janisch C. Hodgsonii var.; könnte als solcher aber auch mit F. 5, nicht vereinigt werden.


  Camp. Bai (Janisch), C. Schmidtii Grunow var. cf. T. 15, F. 12.

  Balearen (Grunow), C. Balearicus Cleve.

- Honduras, C. Rabenhorstii Janisch var. 3. O. E. Honduras, C. Rabenhorstii Janisch var. 4. O. E. Honduras, C. Rabenhorstii Janisch var. (= C. Ecclesianus Grev. var.; Janischs Benennung hat jedoch die Priorität).
- Samos, C. notatus var. Vitiensis Grunow, forma minor. O. E.
- I7. Camp. Bai, C. Phalangium A. S.
   S. Thomas (Grunow), nach Grunow C. crebrestriatus Grev., forma minor.
   Rothés Meer, C. Heufteri Grunow cf. T. 14. F. 25. 25.
- 20. Camp. Bai, C. Rotula Grunow, genau nach einem besonders grossen und schönen Ex. cf. T. 14. F. 10.







### A. Schmidt's

## Atlas der Diatomaceenkunde

### Tafel 54

(Ausgegeben am 15. October 1878.)

#### Verbesserter Abdruck.

Wo keine besondere Angabe der Vergrosserung beigejugt ist, sind die Ablablungen durchweg 660jach vergrossert.




Ausgegeben am 1. November 1886.



- Yarra Yarra, Campylodiscus Daemelianus Grunow.
   Kristianstadt, Schwed, C. Echenëis E.
   Kristianstadt, C. Clypeus E.







### A. Schmidt's

## Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 55

(Ausgegeben am 15. October 1878.)

#### Verbesserter Abdruck.


Wo keine besondere Angabe der Vergrosserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 660 ach vergrossert.

Ausgegeben am 1. November 1886.



- 1. Kristianstadt, 2. Breydon (beide 300 : 1), 3. Franzensbad (660 : 1), Campylodiscus Clypeus E. 4. 5. Kristianstadt, 6. salz. See b. Eisleben, C. bicostatus W. Sm.
- 7. Rothes Meer, C. bicostatus var. arabica Grunow. O. E.
- 8. Rammer Moor, C. noricus E. 9. Sardinien, 10. 11. Strehlen, 12. 13. Quartscheck, 14.—16. Kristianstadt, C. hibernicus E. = C. costatus W. Sm. (Nach Grunow's Ansicht kann C. noricus wegen seiner enger gestellten Rippen von C. hibernicus einstweilen noch getrenut







### A. Schmidt's

## Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 56

(Ausgegeben am 15. October 1878.)

#### Verbesserter Abdruck.

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 660fach vergrössert.


Ausgegeben am 1. November 1886.



- 1. Moron, Surirella Neymeyeri lanisch, O. E. (oder Plagiodiscus Neum., denn Plagiodiscus ist nichts anderes, als eine nierenformige Surirella).
- 2. Auklands I., S. contorta Kitton, O. E
- 3. 4. Gazellen Exp., ohne Fundort, 5. Leton Bank, S. laxa Janisch, (mit S. lata zwar verwandt, aber durchaus nicht mit ihr zu
- 6. Gaz. Exp., fraglich.
  7. Balearen, S. fastuosa var. punctata Grunow, sieh nach des Autors Ansicht seiner S. intercedens nahernd.
  8. Jamaica (Kitton), fraglich.

- 9. Leton Bank, S. manca Janisch, O. E.
  10. Samoa, 11. Gaz. Exp., S. patens A. S. varr.?
  12. Grip, Norweg., fraglich.
  13. 14. Duck Pond, Waterford, Maine (14 c. 956/1), S. arctissima A. S.
  15. 16. Pensacola, S. cruciata A. S.
  17.—19. O. E. von S. Brightwellii W. Sm. cf. T. 24. F. 6. neben dieser keine mit S. Crumena zu verbindende Form!!
  20. Darien, nach Grunow ähnlich seiner S. ovalis var. Kotschyana vom Kunsee.
  21. 22. Pensacola, 23. Lodgie Goldstone, Scotl., S. Mölleriana Grunow.
- 21. 22. Pensacola, 23. Lodgie Coldstone, Scotl., S. Mölleriana Grunow.
- 24. Kerguelen, Foundery Branch, S. Kerguelensis Grunow.
  25. 26. Warrington, S. spiralis K. (Diese kann durchaus nur zu Surirella gestellt werden, denn die Mittellinien ihrer beiden Schalen verlaufen parallel; die Mittellinien der Campylodiscus-Schalen stehen vertical gegen einander.)











DER

# DIATOMACEEN-KUNDE.

IN VERBINDUNG MIT DEN HERREN

GRÜNDLER, GRUNOW, JANISCH, WEISSFLOG und WITT

MI 15. 57 Coscinados cus.

HERAUSGEGEBEN

VON

### ADOLF SCHMIDT,

ARCHIDIAKONUS IN ASCHERSLEBEN.

FÜNFZEHNTES HEFT.

ASCHERSLEBEN,

VERLAG VON ERNST SCHLEGEL.
1878.



# A. Schmidt's Atlas der Diatomaceenkunde

### Heft 15.

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 660fach vergrössert.

Ausgegeben am 15. October 1878.

### Tafel 57.

Sandwichs L,?

Sansego, ? Campeche Bai, ?

Richmond, Virgin. 990: 1, Coscinodiscus armatus Grev. var. (= Cosmiodiscus armatus Grev. 1866). Bei anderer Einstellung erscheinen die hellen Fältchen vor dem Rande als dunkle Striche.

Camp. Bank, C. marginulatus var. curvato-striata Grunow.

6. 7. Camp. Bai, C. Rotula Grunow.

Baltschik, sp. n. ?, mit Folgendem nicht zu verbinden.

9. 10. Cuxhaven, C. fasciculatus A. S., nach Grunow = Heterostephania Rothi; aber nach Pritch. V, 85 müsste diese Art mit viel gröberer Sculptur verschen sein.

11. Yokohama, ganz flach, nur am Rande gewölbt, kein Pseudo-nodulus; 13. Arica, 14. Peru Guano, C. subtilis E.

Moron, C. subtilis ? ?

15.16. Richmond, Virgin., C. subtilis var., ganz flach, mit etwas weiteren Maschen.

17. Cuxhaven, 18. Firth of the Tay, C. Kützingii A. S. (=C. marginatus K.) cf. A.S. Nordsee Diat. III, 35.; nach ganz anderem Gesetz sculpturirt, als C. subtilis; es fehlen ihm nämlich sowohl die die Radien kreuzenden Spiralen, als die kleinen Processe; steht den folgenden Arten naher, als der vorangehenden.

19. Sansego, var. der folgenden Art; mit engeren Maschen. 20.21. Barbadoes, Springfield, C. denarius A. S. Diese Form, welche scharf abgegrenzt zwischen C. Kützingii und C. symmetricus steht, verdient jedenfalls einen besonderen Namen. Ich habe hier immer nur 10 (nur durch die verschiedene Richtung der Maschenreihen gesonderte) Felder bemerkt; bei C. symmetricus befünden sich von den Fraden der Maschenreihen finden sich vor den Enden der Maschenreihen keilförmige Verdickungen der Schale

22. Camp. Bank, mit 11 Feldern und anderem Rande; ob Var.
des Vorigen? (Bei Fig. 19—22 sind die
Maschen am Rande nicht eben kleiner, als in der Mitte).

Rio, sp. n.?

Barbadoes, Springf., C. senarius A. S.

Rio Janeiro, C. symmetricus Grev. t. Kitton. Golf v. Mexico, 27. Singapore, C. symmetricus Grev. t. Weissfl. 28.29. Monterey, fraglich.
30. Monterey, Coscinodiscus, mit C. curvatulus verwandt.
31. Tafelbai, Actinocyclus curvatulus Janisch, immer mit Pseudo-

nodulus; zum Vergleich mit Coscinodiscus curvatulus hier eingerückt.

32. Barbadoes, Springf., 32. dasselbe Ex. 990: 1 in anderer Einstellung, fraglich.

33. Monterey, C. curvatulus Grunow cf. Probeheft zum Atlas F. 7.
Die radialen Krummungen haben in den beiden Schalen eine entgegengesetzte Richtung.

S. Monica, C. curvatulus var. latius striata.

Peru Guano, 36. Yokohama, C. curvatulus var. densius striata? Nicobaren, fraglich, daneben findet sich der richtige C. curvatulus.

Kings Mill L., 990: 1, ganz flach, sp. n.? 39

Tafelbai, sp. n.?

Barbadoes, Springf., 41. Barbad., Cambridge Est., C. tuberculatus Grev. var.? Keine Processe, die
dunkeln Flecke am Rande entstehen dadurch, dass sich je 2 bis 3 Zellchen mit Schalensubstanz füllen.

42. Barb. Cambr. Est., idem?

43. Tafelbai, sp. n.? 44. 45.46. Barb., Springf., fragliche Formen. 47. Richmond, Virgin., abulich C. radiolatus E.Mikrog., XVII, 36.

### Tafel 58.

1. Barbadoes, Springf., ähnlich Coscinodiscus griseus Grev. Aber vielleicht ist diese Benennung mit grösserem Rechte auf die im gleichen Material häufig vorkommenden F. 13. 14 zu beziehen.

-5. ,,

Barbad., Springf., C. biradiatus Grev.

5. " C. elegantulus Grev.

(Weissfl.), fragliche Abnormität. Piscataway, (Weissfl.) C. elegans Grev. Patuxet River, 990:1, fraglich.

Monterey, fraglich. Camp. Bai., C. stelliger Grunow.

Tafelbai, C. lentiginosus Janisch. Grossere Ex. stets elliptisch-Charakteristisch ist das in einem leeren Fleck am unteren Rande (†) stehende Strichelchen (analog T. 59, F. 26).

12. Mors, sp. n. ?

13.14. Barbad., Springf., vergl. das zu F. 1 Gesagte.

15. "

" C. detritus A. S., kommt in diesem Material öfter vor; die Aehnlichkeit mit Craspedodiscus ist eine nur scheinbare; die Mitte ist nicht vertieft; der Kranz rührt nur von Verdickungen der Schale her. 16. Barbad., Springf., stark gewölbt, daher kein C. nitidus!

aber was?
Cap, 18. Camp. Bank, C. nitidus Greg.

Camp. Bank, C. nitidus var.

20.21. Camp. Bai, C. nitidulus Grunow.

Cap, fraglich.
Camp. Bai, 24. Cap, Uebergänge zu folgender Art.
Monterey, 26. 28. Cap, C. cocconeiformis A. S.

27. Leton Bank, C. cocconeiformis var. (Rand viel feiner gestrichelt).

Cap, vielleicht Melosira? Camp. Bai, 31. Mors, fragliche Formen. Yokohama, C. Corolla A. S.

32. Yokohama, C. Corona A. S.
33. Yokohama, C. extravagans A. S.
34. Monterey (Weissfl.), Cestodiscus, viell. Aulacodiscus?
35.36. Moron, fragliche Formen.
37. Upolu (Weissfl.), fraglich. Yokohama (Grundl.), fraglich.

Tafelbai, C. minor E.

Caltanisetta, nach Janisch's und meiner Ueberzeugung der echte C. minor E. Microg. XXII, 7, denn kein anderer Coscinodiscus dieses Materials kann auf die citirte Figur bezogen werden; Grunow freilich ist anderer Ansicht.

41, 42, Südsee (Weissfl.), C. Sol Wallich var? aber wohl von zu feiner Sculptur, um mit F. 45 vereinigt zu werden.

43. Peru Guano, C. Peruanus Grunow. Davis Streat, sehr gewölbt! fraglich.

Java (Gründler), C. Sol Wallich, nach einem trockenen un-präparirten Ex.; hat Randstacheln, welche 44. in dem photographischen Druck leider un-

Java, 47. Japan, 48. Bohuslaen, fraglich, ob zu C. Sol. oder zu C. excentricus zu rechnen (vergl. A. S. Nordsee Diatom. p. 94).

Californien Guano, C. excentricus E. t. Weissfl. & Janisch.

### Tafel 59.

- 1. Nankoori, Coscinodiscus plicatus Grunow, auf der einen Hälfte convex, auf der anderen concav, deshalb in die Nahe von C. excavatus zu stellen.
- 2. S. Francisco, Californ., etwas gewolbt, die Maschen des Randes nur um Weniges kleiner, als die der Mitte. C. suspectus Janisch.
- Yokohama (Gründl.), C. circumdatus A. S.
- Peru Guano, 990: 1, sp. n. ? Kings Mill I., 990: 1, ?

Cap, 990: 1. ?

- Camp. Bank, vielleicht Melosira (die andere Schale ebenso, doch mit 6 unregelmässig stehenden Knöpfchen.
- Oran, vielleicht mit C. minor zu verbinden?
- Springfield 990: 1. ?

Nottingham, ? 10.

Kings Mill I., 990: 1. ?

12.13. Simbirsk, wenig gewolbt, C. subconcavus Grunow.

- 14. Peru Guano, ziemlich gewolbt, nach Grunow C. Labyrinthus Roper var. ?
- Simbirsk, wenig gewolbt, C. subconcavus Grunow var. ?
- Monterey, c. 400: 1, sehr gewolbt, nach Grunow C. concavus Greg. var (nec E.); (Ehrenbergs Art sei nicht zu entziffern, darum aufzugeben).
- 17. Mors, hochgewolbt, in der Mitte eine stark vortretende Papille; zu Möllers Typenplatten fälschlich als Pyxidicula cruciata bezeichnet, ist mit keiner hier abgebildeten Form in nähere Verbindung zu bringen. C. Mölleri A. S.
- 18. Tafelbai, C. decipiens Grunow.

Tafelbai, ob grössere Form des vorigen?

Camp. Bai, 21. Californ., 22. 23. Gazellen Exp., C. nodulifer A. S. (die Mitte trägt stets ein oder einige stark hervortretende Knotchen).

Gaz. Exp., C. Africanus Janisch; Peripherie elliptisch, Mitte der Sculptur stets zur Seite geschoben. Man beachte die eigenthümliche Zeichnung des Randes, welche an dem abgebildeten Ex. in seltener Klarheit hervortrat.

Yokohama, mit vorigem zu verbinden 25.

Gaz. Exp., C. linealus E. (Microg. XXII, 6. ganz so!). Wohl zu beachten ist der einzelne, an grösseren Ex. stets deutlich hervortretende Pseudoprocess, der sein Analogon findet theils in C. lentiginosus Janisch, theils in der später abzubildenden Podosira Monopodiscus Janisch. 26. Grunow hält unsere Abbildung für C. Ma-Aber des letsteren Maschen craeanus Grev. Aber des letsteren Maschen sind schon bei 400facher Vergrösserung den hier 660fach vergrösserten gleich; auch hat derselbe eine elliptische Peripherie und andere

Randzeichnung. 27.28. Moron, 29. Carpentaria, 30 Brasilien, C. lineatus E.

Yokohama, C. lineatus var?

33. Camp. Bank, C. marginato-lineatus A. S.

Yokohama., C. anguste lineatus A. S.

35. Java, unpräparirt von Gründler mehrfach mit 4 Schleimlappen gesehen, 36.37. G. v. Mexiko, C. blandus A. S. 38.39. Tafelbai, Mitte sehr gehoben oder viell. richtiger tief ein-

gesenkt) C. tumidus Janisch.

### Tafel 60.

- 1.2. Yokohama, 3. Peru Guano, 4. Rio, Coscinodiscus devius A. S. Eigenthumlich ist dieser Art so zu sagen das Streben, die radiale Anordnung der Maschen nicht zur Geltung kommen zu lassen.
- 5. Atl. Ocean, Mitte eingesenkt. Nach Grunow sehr grosse und grosszellige Varietät von C. radiatus E.
- Mors, nach Grunow's Ansicht grosszellige Form v. C. radiatus E.
- Santa Monica, nach Grunow Mittelform zwischen C. Oculus Iridis u. C. radiatus. Mir ist er zu derb (deshalb so dunkel gezeichnet), um mit einem der beiden verbunden zu werden.
- Darien, ganz flach, nach Grunow nahe verwandt mit C. Woodwardi Eulenstein; richtig, denn C. Woodwardi erkenne ich jetzt bestimmt in T. 61,
- 9. Marscherde v. Wedel, nach Grunow ein grosszelliger C. radiatus E.

- 10. Oran, traditioneller Typus von C. radiatus E. vergl. Atlas, Probetafel F. 6.
- 11. Caltanisetta erschien mir, wegen seiner völligen Uebereinstimmung mit Microgeol. XXII, 4 als stimmung mit Microgeol. XXII typischer C. radiolatus E. Grunow
- diese Ansicht, Janisch stimmt ihr bei.

  12. Californien (Gründl.), erinnert an C. centralis E. soll's aber nach Grunow nicht sein. Vor den eingeschobenen Radien stehen punktförmige Zellchen, wie bei C. perforatus E. Leider treten diese kleinen Zellchen in der Zeichnung nicht hervor.
- 13. Barbadoes, Springfield, stark gewölbt, darum sehr fraglich mit F. 15. nicht zu vereinigen.
  14. Marscherde v. Wedel, Mitte flach, vor dem Rande stark ge-
- wölbt; fraglich.
- 15. Barbadoes, Springf., stark gewölbt, Maschen gleich kleinen Radiatenblüten; C. convexus A. S.

  16. Peru Guano, verwandt mit C. concinnus; fraglich.

### A. Schmidt's

# Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 57

(Ausgegeben am 15. October 1878.)

#### Verbesserter Abdruck.

Wo keine besondere Angabe der Vergrosserung beigefrigt ist, sind die Abbildungen durchweg 660fach vergrissert.

Ausgegeben am 1. September 1886.



- Sandwichs I., ?
- Sansego, ?
- 3. Campeche Bai, ?
- Richmond, Virgin. 990: 1, Coscinodiscus armatus Grev. var. (— Cosmiodiscus armatus Grev. 1863.) Bei anderer Einstellung erscheinen die hellen Faltchen vor dem Rande als dunkle Striche.
- Camp. Bank, C. marginulatus var. curvato-striata Grunow.

- 6.7. Camp. Bai, C. Rotula Grunow.

  8. Baltschik, sp. n ?, mit Folgendem nicht zu verbinden.

  9.10. Cuxhaven, C. fasciculatus A. S., nach Grunow = Heterostephania Rothi; aber nach Pritsch. V, 85 müsste diese Art mit viel gröberer Sculptur verschen sein.


  11. Yokohama, ganz flach, nur am Rande gewolbt, kein Pseudonodulus; 13. Arica, 14. Peru Guano, C. subtitis E.
- 12. Moron, C. subtilis ? ?
- 15.16. Richmond, Virgin., C. subtil's var., ganz flach, mit etwas weiteren Maschen.


  17. Cuxhaven, 18. Firth of the Tay, C. Kützingii A. S. (= C. marginatus K) cf. A. S. Nordsee Diat. III, 35.; nach ganz anderem Gesetz sculpfurirt, als C. subtilis; es fehlen ihm nämlich sowohl die die Radien kreuzenden Spiralen, als die kleinen Processe; steht den folgenden Arten näher, als der vorangehenden.
- 19. Sansego, var der folgenden Art; mit engeren Maschen.
  20.21. Barbadoes, Springfield, C. denarius A. S. Diese Form, welche scharf abgegrenzt zwischen C. Kutzingii und C. symmetricus steht, verdient jedenfalls einen besonderen Namen. Ich habe hier immer nur to (nur durch die verschiedene Richtung der Maschenreihen gesonderte, Felder bemerkt; bei C. symmetricus befinden sich vor den Enden der Maschenreihen keilformige Verdickungen der Schale von radialer Stellung.
- 22. Camp. Bank, mit 11 Feldern und anderem Rande; ob Var. des Vorigen? (Bei Fig. 19-22 sind die Maschen am Rande nicht eben kleiner, als in der Mitte).
- Barbadoes, Springf., C. senarius A. S.
- 25. Rio Janeiro, C. symmetricus Grev. t. Kitton. 26. Golf v. Mexico, 27. Singapore, C. symmetricus Grev. t. Weissfl.
- 28.29. Monterey, fraglich.


  30. Monterey, Coscinodiscus, mit C. curvatulus verwandt.

- Tafelbai, Actinocyclus curvatulus Janisch, immer mit Pseudonodulus; zum Vergleich mit Coscinodiscus curvatulus hier eingerückt.
  Barbadoes, Springf, 32. dasselbe Ex. 990:1 in anderer Einstellung, fraglich.
  Monterey, C. curvatulus G unow of Probeheft zum Atlas F. 7. Die radialen Krümmungen haben in den beiden Schalen eine entgegengesetzte Richtung.
- 34. S. Monica, C. curvatulus var. latius striata.
- Peru Guano, 36. Yokohama, C. curvatulus var. densius striata? 37. Nicobaren, fraglich, daneben findet sich der richtige C. curvatulus.
- 38. Kings Mill I., 990: 1, ganz flach, sp. n ?
- 39. Tafelbai, sp. n.?
  40. Barbadoes, Springt, 41. Barbad., Cambridge Est, C. tubercufatus Grev. var.? Keine Processe, die dunkeln Fleeke am Rande entstehen dadurch, dass sich je 2 bis 3 Zellehen mit Schatensubstanz fullen.

- 43 Tafelbai, sp. n.? 44.45.46. Barb., Springf., fragliche Formen.
- 47. Richmond, Virgin., ähnlich C. radiolatus E. Mikrog., XVII, 36.







### A. Schmidt's

, 11

# Atlas der Diatomaceenkunde

### Tafel 58

(Ausgegeben am 15. October 1878.)

#### Verbesserter Abdruck.

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigejügt ist, sind die Abbildungen durchweg 660fach vergrössert.

Ausgegeben am 1. September 1886.



- 1. Barbadoes, Springf., Coscinodiscus griseus Grev. Aber vielleicht ist diese Benennung mit grosserem Rechte auf die im gleichen Material häufig vorkommenden F. 13, 14 zu beziehen.
- Barbad., Springf, C. biradiatus Grev.

  5. " C. elegantatus Grev.

  (Weisstl.), fragliche Abnormitat.

  Piscataway, (Weisstl.) C. elegans Grev.
- Patuxet River, 990: 1, fraglich.
- Monterey, fraglich.

  Camp. Bai, C. stelliger Grunow.


  Tafelbai, lentiginosus lanisch. Grössere Ex. stets elliptisch. Charakteristisch ist das in einem leeren Fleck am unteren Rande
  - (†) stehende Strichelchen (analog T. 59, F. 26).
- 13.14. Barbad., Springf, vergl. das zu F. 1 Gesagte.


  15. , , C. detritus A. S., kommt in diesem Material öfter vor; die Achnlichkeit mit Craspedodiscus ist eine nur scheinbare; die Mitte ist nicht vertieft; der Kranz rührt nur von Verdickungen der Schale her.
- 16. Barbad. Springf., stark gewölbt, daher kein ('. nitidus! aber was? 17. Cap, 18. Camp. Bank, C. nitidus Greg. 19. Camp. Bank, C. nitidus var. 20.21. Camp. Bai, C. nitidulus Grunow.

- Camp. Bai, C. nitidulus Granow.
   Cap, fraglich.
   Camp. Bai, 24. (ap, Vebergange zu folgender Art.
   Monterey, 26,28. Cap, C. cocconeiformis A. S.
   Leton Bank, C. cocconeiformis var. (Rand viel feiner gestrichelt.)
   Cap, vielleicht Melosira?
   Camp. Bai, 31. Mors, fragliche Formen.
   Yokohama, C. Corolla A. S.
   Yokohama, C. extravagans A. S.
   Monterey (Weissfl.), Cestodiscus, viell. Aulacodiscus?
   36. Moron, fragliche Formen.
   Upolu (Weissfl.), fraglich.
   Yokohama (Grundl.), fraglich.
   Tafelbai, C. minor E.

- Tafelbai, C. minor E.
- 40. Caltanisetta, nach Janisch's und meiner Ueberzeugung der echte C. minor E. Microg. XXII, 7, denn kein anderer Coscinodiscus
- dieses Materials kann auf die citirte Figur bezogen werden; Grunow freilich ist anderer Ansicht. 41.42. Südsee (Weissfl.), C. Sol Wallich var? aber wohl von zu feiner Sculptur, um mit F. 45 vereinigt zu werden.
- 43. Peru Guano, C. Peruanus Grunow.

- 44. Davis Streat, sehr gewölbt! fraglich.
  45. Java (Gründler), C. So' Wa'lich, nach einem trockenen ur praparitten Ex.
  46. Java, 47. Japan, 48. Bohuslaen, fraglich, ob zu C. Sol. oder zu C. exeentricus zu rechnen (vergl. A. S. Nordsee Diatom. p. 94.)
  49. Californien Guano, C. excentricus E. t. Weisstl. & Janisch.







### A. Schmidt's

# Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 59

(Ausgegeben am 15, October 1878.)

#### Verbesserter Abdruck.

Wo keine besondere Angabe der Vergrößerung beigefägt ist, sind die Abbildungen durchweg 660 jach vergrößert.

Ausgegeben am 1. November 1886.



- 1. Nankoori, Coscinodiscus plicatus Grunow, auf der einen Halfte convex, auf der anderen concav, deshalb in die Nähe von C
- S. Francisco, Californ, etwas gewölbt, die Maschen des Randes nur um Weniges kleiner, als die der Mitte. C. suspectus Janisch.
- Yokohama (Gründl.), C. circumdatus A. S.
- Peru Guano, 990:1, sp. n.? Kings Mill I., 990:1.? Cap, 990:1.?
- Camp. Bank, viell. Melosira (die andere Schale ebenso, doch mit 6 unregelmässig stehenden Knöpfchen.)
- Oran, viell, mit C. minor zu verbinden? Springfield 990:1?

- 10. Nottingham, ?11. Kings Mill I., 990: 1. ?
- 12.13 Simbirsk, wenig gewolbt, C. subconcavus Grunow.


- Peru Guano, ziemlich gewölbt, nach Grunow C. Labyrinthus Roper var.?
   Simbirsk, wenig gewölbt, C. snbconcavus Grunow var.?
   Monterey, c. 400:1, sehr gewölbt, nach Grunow C. concavus Greg. var. (nec E.); (Ehrenbergs Art sei nicht zu entziffern, darum aufzugeben).
   Mois, hochgewölbt, in der Mitte eine stark vortretende Papille; zu Mollers Typenplatten fälschlich als Pyxidicula cruciata bezeichnet, ist mit keiner hier abgebildeten Form in nahere Verbindung zu bringen. C. Mölleri A. S.
- Tafelbai, C. decipiens Grunow.
- 19.
- Tafelbai, ob grössere Form des Vorigen? Camp. Bai, 2:. Californ., 22.23. Gazellen Exp., C. nodulifer A. S. (die Mitte trägt stets ein oder einige stark hervortretende Knötchen.),
- Gaz. Exp., C. Africanus Janisch; Peripherie elliptisch, Mitte der Sculptur stets zur Seite geschoben. Man brachte die eigen-
- thümliche Zeichnung des Randes, welche an dem abgebildeten Ex. in seltener Klaiheit hervortrat.

  Yokohama, mit der vorigen zu verbinden?

  Gaz. Exp., C. lineatus E. (Microg. XXII, 6. ganz so!). Wohl zu beachten ist der einzelne, an grösseren Ex stets deutlich hervortretende Pseudoprocess, der sein Analogon findet theils in C. lentigmosus Janisch, theils in der spater abzubildenden Podosira Monopodiscus Janisch. Grunow halt unsere Abbildung für C. Macraeanus Grev. Aber des letzteren Maschen sind schon bei 400facher Vergrösserung den hier 660fach vergrösserten gleich; auch hat derselbe eine elliptische Paripheria und andere Raudzeichnung. auch hat derselbe eine elliptische Peripherie und andere Randzeichnung.
- 27.28. Moron, 29. Carpentaria, 30. Brasilien, C. lineatus E. 31.32. Yokohama, C. lineatus var?
  33. Camp. Bank, C. marginato-lineatus A. S.
  34. Yokohama, C. anguste lineatus A. S.

- Java, unpräparirt von Gründler mehrfach mit 4 Schleimlapp in gesehen, 36,37. G. v. Mexiko, C. blandus A. S.
- 34.39. Tafelbar, Mitte sehr gehoben (oder viell nichtiger tief eingesenkt) C. tum.dus Janisch.







### A. Schmidt's

## Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 60

(Ausgegeben am 15. October 1878.)

#### Verbesserter Abdruck.

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigejägt ist, sind die Abbildungen durchweg 660 fach vergrössert.

Ausgegeben am 1. November 1886.

make surgery of frequency

- zeichnet), um mit einem der beiden verbunden zu werden.
- Darien, ganz flach, nach Grunow nahe verwandt mit C. Woodwardt Eulenstein; richtig, denn C. Woodwardt erkenne ich 8. jetzt bestimmt in T. 61, F. 2, 3.


  Marscherde v. Wedel, nach Grunow ein grosszelliger C. radiatus E.

- Oran, traditioneller Typus von C. radiatus E. vergl Atlas, Probetafel F. 6.
  Caltanisetta, erschien mir, wegen seiner volligen Uebereinstimmung mit Microgeol. XXII, 4 als typischer C. radiolatus E.,

  Grunow verwift diese Ansieht, Janisch stimmt ihr bei 11.
- Californien (Gründl), erinnert an C. centralis E., soll's aber nach Grunow nicht sein. Vor den eingeschobenen Radien stehen punktförnige Zellchen, wie bei C. perforatus E. Leider treten diese kleinen Zellchen in der Zeichnung

- Barbadoes, Springfield, stark gewölbt, darum sehr fraglich, mit F. 15 nicht zu vereinigen. Marscherde v. Wedel, Mitte flach, vor dem Rande stark gewolbt; fraglich. Barbadoes, Springf., stark gewolbt, Maschen gleich kleinen Radiatenbluthen; C. convexus A. S. Peru Guano, verwandt mit C. concinnus; fraglich.







# ATLAS

DER

# DIATOMACEEN-KUNDE.

IN VERBINDUNG MIT DEN HERREN

GRÜNDLER, GRUNOW, JANISCH, WEISSFLOG und WITT

61 Cascinadiscus 62 - Do 63 - Do

HERAUSGEGEBEN

VON

ADOLF SCHMIDT,

ARCHIDIAKONUS IN ASCHERSLEBEN.

SECHSZEHNTES HEFT.


**ASCHERSLEBEN** 

VERLAG VON ERNST SCHLEGEL.

1878







### Vorläufige Erläuterungen

# A. Schmidt's Atlas der Diatomaceenkunde

### Heft 16.

Wo keine besondere Angabe der Vergrasserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 660fach vergrössert.

Ausgegeben am 15. October 1878.

### Tafel 61.

1. Hong Kong, (Weissfl.), nach Grunow Coscinodiscus heteroporus

E. var.

i. Bei diesem häufig die Erscheinung, dass 2. 3. Carpentaria Bai. die Zellehen auf der einen Seite der Schale zusammen hangen, auf der andern frei liegen. C. Woodwardi Eulenstein. Nach Grunow ist F. 2. C. heteroporus E.

Monterey, flach, nach Grunow C. heteroporus var.

 Monterey, flach, nach Grunow G. heteroporus var.
 Barbadoes, Springfield, ziemlich stark gewolbt; fraglich.
 ", ganz flach, nach Grunow C. heteroporus E. forma major, robustior.
 Barbadoes, Springf., mit F. 6. zu verbinden.
 9. ", etwas gewölbt, G. decrescens Grunow.
 Barbadoes, Cambr. Est., schwach gewölbt. G. decrescens Grunow var. Bei der Abbildung ist die Einstellung gewählt. in welcher die subradialen stellung gewählt, in welcher die subradialen Streifen am deutlichsten hervortreten. In anderer Einstellung wurde die Zugehorig-keit dieser Form zu F. 8. u. 9. ganz augen-

fällig geworden sein. 11.12. Barbadoes, Springf., ganz flach C. bulliens A. S. Ein

Präparat mit einem grösseren Ex. dieser Art, an welchem der Kranz der grossen Zellen viel stärker hervortrat, so wie die Zeichnung dieses Ex. sind mir leider abhanden gekommen.

13. Mors, fast flach, erinnert mich an C. Argus E., Microg. XXII, 5. Da aber Microg. XVI, 2 offenbar etwas ganz anderes als C. Argus abgebildet ist, wird diese Ehrenberg'sche Art, wie viele andere zu streichen sein, weil wir sonst aus der Confusion nicht herauskommen,

14. Barb., Springf., Mitte flach, Rand gewolbt, fraglich.
15. ", ", ziemlich gewolbt. C. deerescens Grunow?
16. Moron, schwach gewolbt; 17. Santa Monica, kaum ein wenig gewolbt; 18. Moron, mehr oder weniger gewolbt. Bei allen dreien stehen vor den eingeschobenen Radien, wie bei C. perforatus, punktformige Zellchen, F. 17. C. obscurus A. S. F. 16, 18. mogen als Varietäten desselben

angesehen werden. 19. Barbad., Cambr. Est., nach Grunow C. crassus Bailey var.

### Tafel 62.

Nicobaren, flach Monterey, 3. Santa Monica, beide fast flach } fragliche Formen.

San Diego, wenig gewölbt, Zellen vor dem Rande bedeutend kleiner; ähnlich C. marginatus E. Microg. XVIII, 44; nach Grunow Mittelform zwischen

C. marginatus E. u. C. robustus Grev. 5. 6. Santa Monica, etwas gewolbt, nach Grunow Coscinodiscus

robustus Grev. Monterey, zieml. gewölbt, C. subconcavus Grunow forma major? Nord Celebes (Gründl.), schwach gewolbt, der Rand scheint mit zahlreichen, Knötchen tragenden Stacheln besetzt zu sein. Nach Grunow sehr ähnlich dem C. concavus Greg. (E. ??), aber mit grossen Zellen. Nach meiner Ansicht gehört diese Form viell. zu Endyctia, welche

eigentlich von diesen ersten 8 Coscinodiscus-Tafeln ausgeschlossen werden sollte,

9. Monterey, fast flach, fraglich,

10. Barbad., Springf., flach, 11. 12. Richmond, Virg. Ich würde diese Figuren auf C. velatus E. Microg. XVIII, 37 beziehen, wenn ihre Zellchen dafur nicht zu klein wären. Grunow meint, die Schale von C. velatus sei überall mit feinen Pünktchen bedeckt. Solche habe ich hier nicht wahrgenommen.

13, 14. Barb., Springf., 15. Barb., Cambr. Est., fast flach. sp. n.? 16. Monterey (Weissfl.), 400: 1 etwas gewolbt, 17. dasselbe Ex. 660: 1, als C. robustus Grev. bezeichnet, was Grunow verwirft.

18. Monterey, flach, nur am Rande schroff abfallend, fraglich.

### Tafel 63.

- 1. Hvidingsoe, erinnert an Coscinodiscus centralis E. Microg. XVIII, 39. (Aber Microg. XXI, 3. u. XXII, 1. stellen offenbar ganz Anderes unter dieser Benennung dar, so dass wir uns schwerlich
- Benennung dar, so dass wur uns schwerlich darüber einigen werden, was C. centralis sei.

  Monterey, Rand gewölbt; nach Grunow C. Omphalanthus E. Monterey, 4. Ichaboe Guano, 5. Arica, bei 3. u. 5. bemerkt man auf den Ecken der meistens hexagonalen Maschen Punkte. Diese Formen wären nach Grunow's Ansicht C. Oculus Iridis E., wenn nicht die Randstacheln es wahrscheinlich machten, dass wir hier eine n. sp. vor uns haben; also bis auf woiteres n. sp. vor uns haben; - also bis auf weiteres fraglich.
- 6.7. Java. Ich gedachte vorzuschlagen, wir möchten diese schön ausgeprägte Form als Typus von C. Oculus Iridis betrachten; aber Grunow findet ihre Randzellen zu gross und will sie desshalb nur als C. Oculus Iridis var. anerkennen.
- 8. Java, eine sehr interessante Anomalie der vorigen Form.

- 9. Mors, die hellere Partie mit deutlich gezeichneten Papillen liegt im Focus, Mitte und Rand treten da-gegen zurück. Eine dritte schön ausgeprägte Form, die von Einigen für C. Oculus Iridis genommen wird.
- Santa Monica, fast flach, Papillen in der Mitte kaum zu er-kennen. Wieder eine neue hierher gehörige Form mit abweichendem Centrum.
- Der schroff abfallende Rand mit der sich Santa Monica. 11. allmählich einsenkenden Mitte in gleichem Niveau. C. borealis Bailey (nec E.)
- Santa Monica, C. Asteromphalus E. mit grossen Zellen.
- Nottingham, C. biangulatus A. S. Im Innenrande stets 2
  Winkel, welche etwa 1/4 der Peripherie einschliessen. 13a obere, 13b untere Schalen schicht.
- 14. Nord Celebes, C. bisinuatus A. S. 15. ebendaher, Bruchstückvon einem grösseren Ex. In diesen beiden neuen Arten zeigt Coscinodiscus eine Tendenz zu Eupodiscus Jonesianus.

#### Tafel 64.

- 1. Nankoori, Coscinodiscus Gigas E. und zwar ein kleines Ex. Nach Ehrenberg hätte diese Art keine Area. Einen C. Gigas ohne Area habe ich nie gesehen.
- Santa Monica, etwas gewölbt; C. Diorama A. S. Ichaboe Guano, 4. daselbst, Rand und Mitte eines grösseren Ex. C. Janischii A. S. (= C. marginatus Janisch nec E.)
- 5. 6. Peru Guano, 7. 8. Richmond, Virgin., ganz flach; C. apiculatus E.
- Nottingham, C. apiculatus var.
- 10. Nottingham, C. apiculatus ?
- 11. Moron, fraglich.
- 12. Richmond, Virgin., 13. Arica, 14. Peru Guano, C. perforatus E. Hier sind die punktförmigen Zellen vor den eingeschobenen Radien charakteristisch.
- 15. Camp. Bai, fraglich.

### A. Schmidt's

# Atlas der Diatomaceenkunde

### Tafel 61

(Ausgegeben am 15. October 1878.)

### Verbesserter Abdruck.

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 6601ach vergrössert.


Ausgegeben am 1. September 1886.




1. Hong Kong (Weissfl.), nach Grunow Coscinodiscus heteroporus E. var.
2.3. Carpentaria Bai. Bei diesem häufig die Erscheinung, dass die Zellehen auf der einen Seite der Schale zusammen hangen, auf der andern frei liegen. C. Woodwardi Eulenstein. Nach Grunow ist F. 2. C. heteroporus var.

- Carpentaria Bai. Bei diesem häung die Eischemung, dass die Zellehen auf der einen Seite der Schale zusammen hangen, auf der andern frei liegen. C. Woodwardi Eulenstein. Nach Grunow ist F. 2. C. heteroporus var.
   Barbadoes, Anch Grunow C. heteroporus var.
   Barbadoes, Springfield, ziemlich stark gewölbt. fraglich.
   ", "ganz flach, nach Grunow C. heteroporus E. forma major, robustior.
   Barbadoes, Springf., mit F. 6 zu verbinden.
   Barbadoes, Springf., mit F. 6 zu verbinden.
   Barbadoes, Cambr. Est., schwach gewölbt. C. decrescens Grunow.
   Barbadoes, Cambr. Est., schwach gewölbt. C. decrescens var. Bei der Abbildung ist die Einstellung gewählt, in welcher die subradialen Streifen am deutlichsten hervortreten. In anderer Einstellung würde die Zugehörigkeit dieser Forn zu F. 8. u. 9. ganz augenfallig geworden sein.
   Barbadoes, Springf., ganz flach, C. bullens A. S. Ein Präparat mit einem grösseren Ex. dieser Art, an welchem der Kranz der grossen Zellen viel stärker hervortrat, so wie die Zeichnung dieses Ex sind mir leider abhanden gekommen als C. Argus abgebildet ist, wird diese Ehrenberg'sche Art, wie viele andere zu streichen sein, weil wir sonst aus der Confusion nicht herauskommen
   Barb., Springf., Mitte flach, Rand gewolbt, fraglich.
   ", ", ", ziemlich gewölbt, C. decrescens Grunow?
   Moron, schwach gewölbt, 17. Santa Monica, kaum ein wenig gewölbt; 18. Moron, mehr oder weniger gewölbt. Bei allen dreien stehen vor den eingeschobenen Radien, wie bei C. perforatus, punktformige Zellchen. F. 17. Cobscurus A. S. F. 16. 18. mögen als Varietäten desselben angesehen werden.
   Barbad, Cambr. Est., nach Grunow C. crassus Bailey var.







## A. Schmidt's

## Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 62

(Ausgegeben am 15. October 1878.)

#### Verbesserter Abdruck.

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 660 jach vergrössert.

Ausgegeben am 1. September 1886.



 Nicobaren, flach
 Monterey, 3. Santa Monica, beide fast flach
 San Diego, wenig gewölbt, Zellen vor dem Rande bedeutend kleiner; ähnlich C. marginatus E. Microg. XVIII, 44; nach Grunow Mittelform zwischen C. marginatus E. u. C. robustus Grev.
 Santa Monica, etwas gewölbt, nach Grunow Coscinodiscus robustus Grev.
 Monterey, zieml. gewölbt, C. subconcavus Grunow forma major?
 Nord Celebes (Gründl.), schwach gewölbt, der Rand scheint mit zahlreichen, Knötchen tragenden Stacheln besetzt zu sein.

 Nach Grunow sehr ähnlich dem C. concavus Greg. (E ? ?), aber mit grossen Zellen. Nach meiner Ansicht gehört diese Form viell. zu Endyctia, welche eigentlich von diesen ersten 8 Coscinodiscus-Tafeln ausgeschlossen werden sollte.


 schlossen werden sollte.


Monterey, fast flach, fraglich.
Barbad., Springf., flach, 11. 12. Richmond, Virg. Ich würde diese Figuren auf C. velatus E. Microg. XVIII, 37 beziehen, wenn ihre Zellchen dafür nicht zu klein wären. Grunow meint, die Schale von C. velatus sei überall mit feinen Pünktchen bedeckt. Solche habe ich hier nicht wahrgenommen.

13.14. Barb., Springf., 15. Barb., Cambr. Est, fast flach. sp. n.?

16. Monterey (Weissfl.), 400:1 etwas gewölbt, 17. dasselbe Ex. 660:1, als C. robustus Grev. bezeichnet, was Grunow verwirft.

18. Monterey, flach, nur am Rande schroff abfallend, fraglich.





### A. Schmidt's

## Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 63

(Ausgegeben am 15. October 1878.)

#### Verbesserter Abdruck.


Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 1500 ach vergrössert.




- Hvidingsoe, erinnert an Coscinodiscus centralis E. Microg. XVIII, 39. (Aber Microg. XXI, 3 u. XXII, 1. stellen offenbar ganz Anderes unter dieser Benennung dar, so dass wir uns schwerlich darüber einigen werden, was C. centralis sei.
   Monterey, Rand gewölbt; nach Grunow C. Omphalanthus E.
   Monterey, 4. Ichaboe Guano, 5. Arica, bei 3 u. 5. bemerkt man auf den Ecken der meistens hexagonalen Maschen Punkte.

   Diese Formen wären nach Grunow's Ansicht C. Orulus Iridis E, wenn nicht die Randstacheln es wahrscheinlich machten, dass wir hier eine n sp. vor uns haben; also bis auf weiteres fraglich

   Java. Ich gedachte vorzuschlagen, wir möchten diese schon ausgeprägte Form als Typus von C. Oculus Iridis betrachten, aber Grunow findet ihre Randzellen zu gross und will sie desshalb nur als C. Oculus Iridis var, anerkennen.
   Java, eine sehr interessante Anomalie der vorigen Form.
- Java, eine sehr interessante Anomalie der vorigen Form.
- Java, eine sehr interessante Anomane der vongen Form.
   Mors, die hellere Partie mit deutlich gezeichneten Papillen liegt im Focus, Mitte und Rand treten dagegen zuruck. Eine dritte schön ausgeprägte Form, die von Einigen für C. Oculus Indis genommen wird.
   Sancta Monica, fast flach, in der Mitte kaum zu erkennen. Wieder eine neue hierher gehörende Form mit abweichendem Centrum.
   Santa Monica. Der schroff abfallende Rand mit der sich allmahlich einsenkenden Mitte in gleichem Niveau. C. borealis Bailey (nec E.)
- Santa Monica, C. Asteromphalus E. mit grossen Zellen. Nottingham, C. biangulatus A. S. Im Innenrande stets zwei Winkel, welche etwal 4 der Pempherie einschließen. 13a obere,
- Nord Celebes, C. bisinuatus A. S. 15. ebendaher, Bruchstück von einem grösseren Ex. In diesen beiden neuen Arten zeigt Coscinodiscus eine Tendenz zu Eupodiscus Jonesianus.





 $\mathbf{z}\mathbf{u}$ 

### A. Schmidt's

## Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 64

(Ausgegeben am 15. October 1878.)


#### Verbesserter Abdruck.


Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefägt ist, sind die Abbildungen durchweg 660jach vergrössert.



- Nankoeri, Coscinodiscus Gigas E. und zwar ein kleines Ex. Nach Ehrenberg hatte diese Art keine Area. Einen C. Gigas ohne Area habe ich nie gesehen.
   Santa Monica, etwas gewölbt; C. Diorama A. S.
   Ichaboe Guano, 4. daselbst, Rand und Mitte eines grösseren Ex.
   Peru Guano, 7.8. Richmond, Virgin., ganz flach; C. apiculatus E.
   Nottingham, C. apiculatus var.
   Nottingham, C. apiculatus ?
   Moron, fraglich.
   Richmond, Virgin., 13. Arica, 14. Peru Guano, C. perforatus E. Hier sind die punktformigen Zellen vor den eingeschobenen Radien charakteristisch.
   Camp. Bai, fraglich.

- 15. Camp. Bai, fraglich.









## ATLAS

DER

## DIATOMACEEN-KUNDE.



IN VERBINDUNG MIT DEN HERREN

### GRÜNDLER, GRUNOW, JANISCH und WITT

65. Cascinudiseur

HERAUSGEGEBEN

66. Craspedodiscus

VON

67. Auliseus

Arismeiliecs ADOLF SCHMIDT,

ARCHIDIACONUS IN ASCHERSLEBEN.

HEFT.

ASCHERSLEBEN.

ERNST SCHLEGEL'S VERLAG UND BUCHDRUCKEREL







### Vorläufige Erläuterungen

## A. Schmidt's Atlas der Diatomaceenkunde

### Heft 17.

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 660 jach vergrossert.

Ausgegeben am 20. Juli 1881

#### Tafel 65.

1. Piscataway (Weissfl.), Coscinodiscus excavatus Grev.

Aegina (aus Ehrenberg's Material); ganz flach, Zellen in der Mitte freistehend, ohne scharfe Umrisse, vom halben Radius an bis zum Rande ein Maschennetz bildend; keine Punkte auf den Maschenecken; vor den eingeschobenen Radien oft ganz unscheinbare punktförmige Zell-chen; hält die Mitte zwischen C. Gigas u. C. Diorama, Nach Grunow C. Woodwardii

Eulenst. var. 3. Aegina; Zellen nach dem Rande zu kleiner, häufig oval.
C. fimbriatus-limbatus E. Microg. XVII, 4.

4.—6. Aegina; von Fig. 3 specif. nicht zu trennen, wenig gewölbt.
7. Aegina; schwach gewölbt; viell. C. limbatus E. Microg. XX, 29. Grunow möchte alle diese Formen von 2.—7 als Varr. unter C. radiatus E. stellen. Ich theile diese Ansicht nicht. Demnächst werde ich Abbildungen von dem echten C. radiatus E. geben, welcher von den vorstehenden Formen sehr verschieden ist, da gegen von C. Oculus Tridis E. nicht getrennt werden kann.

Aegina, fraglich.

Monterey (Grunow), von Grunow vorläufig C. subvelatus genannt. Peru Guano, 12. 13. Valparaiso, Endyctia oceanica E.

11. St. Vincent, Austral. (Weissfl.), ähnlich Coscinodiscus splendidus Grev., nur sind in d. Abbildung desselben in Trans. M. S. XIII., N. S. Pl. V., F. 3. die Maschen in der Mitte nicht weiter,

als am Rande. 14-16. Nord Celebes (Grundl.), Schale ganz flach, Endyctia minor A. S.

17. Piscataway (Weissfl.), 18. Camp. Bai (Grundl.); ich wage diese beiden Novitäten nicht zu benennen, bevor ich deren Gürtelband-Ansichten gesehen habe

19.20. Camp. Bai, Stephanopyxis Campechiana Grunow.

### Tafel 66.

- 1. Nottingham (Weissfl.), Craspedodiscus elegans E.
- Nankoori (Gründl.), Cr. insignis A. S.
- 3.4. Nottingham (Weissfl.), Cr. Coscinodiscus E.
  5. Nankoori (Gründl.), Cr. Coscinodiscus var. Nankoorensis Grunow.
  6. Springfield, Cr. ovalis Grunow (= Porodiscus splendidus Grev. var.?)
- 7-9. Springfield, Cr. oblongus Grunow (= Porodiscus obl. Grev.) 10.11. Springfield, Coscinodiscus oblongus Grev.; ist unbedingt zu Craspedodiscus zu rechnen.
  Nottingham (Weissfl.), Coscinodiscus Lewisianus Grev.
  Monterey (Weissfl.), Craspedod. rhombicus Grunow.

### Tafel 67.

- Santa Monica (Joynson), Auliscus Hardmanianus Grev.
- Crescent City (Joynson), A. Joynsonii A. S. Santa Monica (Kitton), A. Biddulphia Kitton.
- Barbadoes (Joynson), A. elaboratus Ralfs.

  Moron (Joynson), A. Normanianus Grev. Nach (Reinere keineswegs typische Form. Nach Grunow
- Santa Monica (Joynson), A. Stöckhardtii lanisch (1861.) = A. racemosus Ralfs (1863).
- La Guayra (Joynson), A. punctatus Bailey var.?
  Darien (Gründl.), A. punctatus Bailey var.
- 9.10. Darien, A. Caribaeus Cleve Mspt.
- 11. Aegina, A. Gigas E. = A. caelatus Bailey forma major.

- Darien, A. caelatus var.
  Auklands I. (Grunow), A. caelatus Bailey var. Auklandica Grunow.
  Leton Bank (Janisch), sehr gewölbt; Pseudauliscus Letoniensis
  Janisch.

### Tafel 68.

- Kamtschatka, Arachnoidiscus Ehrenbergii Bailey.
- Monterey (Grunow), A. Ehrenbergii var. Montereyana. St. Francisco (Weissfl.), 4. Californien, A. Ehrenbergii var. 3.
- Californica. Monterey (Weissfl.), A. Grevilleanus Hardm. Für die Artgültigkeit dieser Form lässt sich hervorheben, dass die Zellchen in der Mitte ziemlich deutliche Papillen tragen — d. h. scheinbar, denn genau genommen sind's kleine Aushöhlungen, welche ein papillenartiges Ansehen haben.
- 6. Monterey (Gründl.), A. indicus E. var. (Die nächste Arach-
- noidiscen-Tafel wird eine noch genauere Abbildung dieser interessanten Form bringen).
- 7. Monterey (Grunow), nach Grunow, der übrigens auch A. indicus nur als A. Ehrenbergii var. gelten lassen will, A. Ehrenbergii var. evanescens. Ich halte dafür, dass A. Ehrenbergii auf Grund der eigenthümlich gestalteten Radien von allen andern Formen abgesondert werden kann und möchte diese Figur für A.
- indicus var. nehmen.
  9.10. Gaz. Exp. (Janisch), kleine Varietäten von A. indicus?
  11. Barbadoes, Springfield, A. Barbadensis A. S.

### A. Schmidt's

## Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 65

(Ausgegeben am 15. October 1878.)

#### Verbesserter Abdruck.

Wo keine besondere Angabe der Vergrosserung beigejagt ist, sind die Abbildungen durchweg 660 jach vergrossert.

Ausgegeben am 1. September 1886.




Piscataway (Weissfl.), Coscinodiscus excavatus Grev.
 Aegina (aus Ehrenberg's Material); ganz flach, Zellen in der Mitte freistehend, ohne scharfe Umrisse, vom halben Radius an bis zum Rande ein Maschennetz bildend; keine Punkte auf den Maschenecken; vor den eingeschobenen Radien oft ganz unscheinbare punktförmige Zellchen; halt die Mitte zwischen C. Gigas u. C. Diaroma. Nach Grunow C. Woodwardii Eulenst. var.
 Aegina; Zellen nach dem Rande zu kleiner, häufig oval. C. fimbriatus-limbatus E. Microg. XVII, 4.
 Aegina; von Fig. 3 specif. nicht zu trennen, wenig gewölbt.
 Aegina; schwach gewölbt; viell. C. limbatus E. Microg. XX, 29. Grunow möchte allediese Formen von 2-7 als Varr. unter C. radiatus E. stellen. Ich theile diese Ansicht nicht. Dennachst werde ich Abbildungen von dem echten C. radiatus E. geben, welcher von den vorstehenden Formen sehr verschieden ist, dagegen von C. Oculus Iridis E. nicht getrennt werden kann.
 Aegina. fraglich.


Aegina, fraglich.


band-Ansichten gesehen habe


19,20, Camp. Bai, Stephanopyxis Campechiana Grunow.











### A. Schmidt's

## Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 66


(Ausgegeben am 15. October 1878.)

#### Verbesserter Abdruck.

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 660fach vergrössert.



- 1. Nottingham (Weissfl.), Craspedodiscus elegans E.
  2. Nankoori (Gründl.), Cr. insignis A. S.
  3.4. Nottingham (Weissfl.), Cr. Coscinodiscus E.
  5. Nankoori (Gründl.), Cr. Coscinodiscus var. Nankoorensis Grunow.
  6. Springfield, Cr. ovalis Grunow (=Porodiscus splendidus Grev. var.?)
  7.—9. Springfield, Cr. oblongus Grunow (= Porodiscus obl. Grev.)
  10.11. Springfield, Coscinodiscus oblongus Grev.; ist unbedingt zu Craspedodiscus zu rechnen.
  12. Nottingham (Weissfl.), Coscinodiscus Lewisianus Grev.
  13. Monterey (Weissfl.), Craspedod. rhombicus Grunow.)





### A. Schmidt's

## Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 67

(Ausgegeben am 15. October 1878.)

#### Verbesserter Abdruck.

Wo keine besondere Angabe der Vergrosserung beigefagt ist, sind die Abbildungen durchweg 660 jach vergrossert.





- 1. Santa Monica (Joynson), Auliscus Hardmanianus Grev.

- Santa Monica (Joynson), Ausscus Hardmanianus Grev.
   Crescent City (Joynson), A. Joynsonii A. S.
   Santa Monica (Kitton), A. Biddulphia Kitton.
   Barbadoes (Joynson), A. elaboratus Ralfs.
   Moron, (Joynson), A. Normanianus Grev. Nach Giunow kleinere keineswegs typische Form
   Santa Monica (Joynson), A. Stöckhardtii Janisch (1861) = A. racemosus Ralfs (1863)
   La Guayra (Joynson), A. punctatus Bailey var.?
   Lovien (Canada), A. punctatus Bailey var.?

- 8. Darien (Grundl.), A. punctatus Bailey var.
  9.10. Darien, A. Caribaeus Cleve Mspt.
  11. Aegina, A. Gigas E. = A. caelatus Bailey forma major.
  12. Darien, A. caelatus var.

- Auklands I. (Grunow), A. caelatus Bailey var. Auklandica Grunow.
   Leton Bank (Janisch), sehr gewolbt; Pseudauliscus Letoniensis Janisch.





zu

### A. Schmidt's

## Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 68

(Ausgegeben am 15. October 1878.)

#### Verbesserter Abdruck.

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigejägt ist, sind die Abbildungen durchweg 660fach vergrössert.

Ausgegeben am 1. September 1886.




Kamtschatka, Arachnoidiscus Ehrenbergii Bailey.


Kamtschatka, Arachholdiscus Ehrenbergii Bailey.
 Monterey (Grunow), A. Ehrenbergii var. Montereyana.
 St. Francisco (Weissfl), 4. Californien, A. Ehrenbergii var. Californica.
 Monterey (Weissfl.), A. Grevilleanus Hardm. Für die Artgultigkeit dieser Form lässt sich hervorheben, dass die Zellchen in der Mitte ziemlich deutliche Papillen tragen — d. h. s. heinbar, denn genau genommen sind's kleine Aushöhlungen, welche ein papillenartiges Ansehen haben.
 Monterey (Gründl.), A. indicus E. var. (Die nächste Arachholdiscen-Tafel wird eine noch genauere Abbildung dieser interessanten Form bringen)

ten Form bringen).

7. Monterey (Grunow), nach Grunow, der übrigens auch A. indicus nur als A. Ehrenbergti var. gelten lassen will, A. Ehrenbergti var. evanescens. Ich halte dafur, dass A. Ehrenbergti auf Grund der eigenthümlich gestalteten Radien von Der von abressendert werden kann und möchte diese Figur für A. indicus var. nehmen. allen andern Formen abgesondert werden kann und möchte diese Figur für A. indicus var. nehmen, 9.10. Gaz. Exp (Janisch), kleine Varietaten von A. indicus?

11. Barbadoes, Springfield, A. Barbadensis A. S.







## ATLAS

DER

## DIATOMACEEN-KUNDE.


IN VERBINDUNG MIT DEN HERREN

GRÜNDLER, GRUNOW, JANISCH und WITT

# ADOLF SCHMIDT,

ARCHIDIACONUS IN ASCHERSLEBEN.

HEFT.



## A. Schmidt's Atlas der Diatomaceenkunde

### Heft 18.

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefügt ist, sind die Abbiklungen durchweg 660fach vergrössert.

Ausgegeben am 20. Juli 1881.

#### Tafel 69.

Plast. Thon v. Aegina (Ehrenbergs Material), Navicula Crabro E.

S. Monica, N. Crabro E. var.

Oran, N. Crabro E. var. Oranensis A. S.

Nankoori (Grunow), N. Crabro E. var. Nankoorensis Grunow. Monterey (Grunow), N. ornata A. S. Moron, N. expedita A. S.

7.8. Nord Celebes (Gründl.), N. expleta A. S.

Gaz. Exp., N. Dirrhombus A. S.

Gaz. Exp., fraglich. Camp. Bai, N. coarctata A. S. (das grösste bis jetzt aufgefundene Ex.)

Funafuti (Gründler), N. limitanea A. S. var.?

Sorrento, N. exemta A. S. var.? 13.

Successful Bai, fraglich; zwischen 2 Rippen je eine einfache Reihe perlförmiger Grübchen, bei anderer Einstellung erscheinen statt dieser 2 Punktreilien.

15. Camp. Bai (Gründl.), N. Puella A. S. grössere Form.
16.17. Aegina, N. Beyrichiana A. S. Nach Grunows Mittheilung soll dies N. Williamsonii O'Meara sein; aber O'Meara's Abbildung (Ir. Diat. Pl. 33, f. 32) ist von der meinigen so total verschieden, dass ich nicht einmal eine entfernte Verwandtschaft beider Formen anzunehmen wage,

18.19. Baldjik, N. moesta A. S., nächste Verwandte von N. bomboides A. S.

Gaz. Exp. Bestimmung vorbehalten. Auf den Riefen stehen zwischen den Längsrippen 2 Pünktchen; daher in unserer Zeichnung die feinen Linien zwischen den Längsrippen.

21. Camp. Bai (Janisch), N. Chersonensis Grunow var.

22. Camp. Bai (Janisch), N. splendida var. diplosticia Grunow. Wir haben hier die zu Atl. 13, 28, 29, gehörende Regenerationsform vor uns.

Sorrento, cf. Atl. 12, 48, fraglich. Raised Marsch, N. interrupta var.

25. Yokohama, zu N. Puella A. S. zu rechnen. 26.27. Baldjik, N. digrediens A. S., verwandt mit N. divergens A. S. 28.29. Aegina, in verschiedener Einstellung gezeichnet, N. Bombus E. Das ware also die echte Ehrenbergsche Form dieser Art, welche aber keineswegs als deren naturlicher Typus zu betrachten ist; viel-

mehr erscheinen die ungewöhnlich breiten, flaschenformigen Spaltrinnenleisten als Localeigenthümlichkeit.

50. Aegina, N. didyma E., grosses Ex. mit Annäherung an N.

Kutzingii. 31. Baldjik, N. lineata Donkin var. Aegina, N. succincta A. S. var.? cf. A. S. Nordsee Diat

Yokohama, vielleicht zu N. vetula A. S. (Atl. 12, 49.) zu rechnen.

34. Santa Monica, N. demia A. S.

Cap. d. g. H., kritisch. 35.

Rothes Meer, N. vana A. S., am nächsten mit N. futifis A. S., (Atl. 13, 17) vorwandt.

Japan, 38,39. Rio, Brasil., zunachst mit N. didyma K. verwandt.

Nord Celebes, nach Grunow's Vermuthung kleine Form v. N. exemta A. S., Atl. 11, 25, 29.

Aegina, N. Apis Donk., kleine Form.

Leton Bank, N. constricta Granow var.?

Carpentaria Bai, 44. Baldjik, N. Apis Donk. varr. Californien, N. subnuda A. S. (Atl. 12, 44.) var. densestriata.

### Tafel 70.

Fig. 1-30 Gruppe derjenigen Naviculen, bei welchen der meistens fehlende Mittelknoten durch an den Mittelporen der Spaltrumen abgelagerte Wülste ersetzt wird

1-4. Northumberland, (F. 1-3 noch mit Mittelknoten) Navicula hyalina Donk. (sehr fein gestreift.)

New Castle, N. hyalina Donk. var.

Camp. Bai, (sehr fein gestreift) N. pygmaea K. var.? Elmen b. Magdeburg, N. pygmaea K.

8. Valparaiso, fraglich.
9. Camp. Bai, N. bioculata Grunow.
10. Sansego, N. bioculata Grun. var.
11.12. Java, 13. Cap d. g. H., fraglich.

Yokohama, 15. engl. Kuste, 16. Camp. Bank, N. forcipata Grev. var. densestriata.

Northumberland, N. forcipaia Grev. kleine Form, (grössere Formen in A. S. Nordsee Diat. II, 16, 18.)

Sölsvig, 19, 20, Sansego, N. forcipata Grev. var. versicolor Grunow.

Nord Celebes, 22. Quarnero, dieselbe mit Stauros.

23-25. (24. 25. dasselbe Ex. in verschiedenen Einstellungen gezeichnet) N. Reichardtii Grunow.

Golf v. Mexico, 27, 29, Java, 28, Camp. Bai, fragliche Formen. 30.31. Sansego, N. forcipata Grev. var. nummularioides Grunow.

32. Nordsee, N. forcipata Grev. var. minor.

Camp. Bai, wahrscheinl. sp. n.

Camp. Bank, N. forcipata var. ? 36. Cap. d. g. H., (Atl. 8, 57) N. Nicobarica Grunow var.?

35.36. Cap. d. g. H., (Atl. 37. Valparaiso, 38. Cap d. g. H., nach Grunow N. nummularia Grev. var.

39.40. Cap. d. g. H., wahrscheinl. sp. n.

Samoa, N. Samoensis Grunow.

Jamaica (Kitton), N. carinifera Grunow var. densius striata (cf. Atl. 2, 1, 2.).

Leton Bank (Janisch), N. Schleinitzii Janisch, nach Grunow N. Hennedyi var.

Gaz. Exp., N. nebulosa Greg. var.

45. St. Brieuc, N. Sandriana Grunow.

46. S. Diego (Grundl.), N. O' Swaldii Janisch, nach Grunow N. excavata Grev, var. mesoleia (mit Stauros).

Rothes Meer, N. Lyra E. var.

Jamaica (Kitton), N. Caribaca Cleve (Atl. 2, 17). Gaz. Exp. (Weissfl.), N. proxima Janisch, (Riefen schwer zu erkennen).

50. Samoa (Grundl.), N. clavata Greg. 51.52. Carpentaria B. (Janisch), N. bullata var. Mölleriana Janisch. 53. Gaz. Exp., N. coffeiformis A. S. var. subcircularis.

Jamaica (Kitton), N. coffeiformis A. S. var. densestriata.

55,56. Baldjik, N. sejuncta A. S. var. Baldjikiana.? 57. Platten See, 58. Elmen, 59. Pensacola, fragliche Formen. Nordsee, N. fraudulenta A. S. (cf. A. S. Nordsee Diat. III, 18, die Figur rechts) bisher für eine Cocconeis

gehalten, aber es haben sich Exemplare mit beiden Schalen gefunden, deren jede mit Spaltrinnen verschen war).

61. Camp. Bank, N. scintillans A. S. Stavanger, N. scutiformis Grunow.

Quarnero, N. Ovulum Granow.

Camp. Bai (Grunow), 65. Gaz. Exp. (Weissfl.), N. Campylodiscus Granew varr.

66. Gaz Exp., N. congrua Janisch.

67. Grip, Norwegen., fraglich.

68. Cap. d. g. H., fraglich.

69. Gaz. Exp., N. compar lanisch, (verwandt mit N. discrepans  $\Lambda, S, Atl, 8, 8$ ).

Gaz. Exp., N. munda Janisch.

Leton Bank (Janisch), N. Eudoxia A. S. var. 71. Leton Bank (Janisch), N. pristiophora Janisch.

Jamaica (Kitton,, N. Granovii Rabenh., forma minor.

Moron (Janisch) sp. n.?

### Tafel 71.

1-5. Platten See, Schizonema lacustre Ag., aus der Gruppe Pseudo-Encyonema - Colletonema subcohaerens Thwaites, Encyonema Ungeri Grunow (Atl., 10, 63).

6-7. Platten See, Encyonema prostratum Ralfs.
8.9. Muhlegg b. St. Gallen, Encyon, postratum var. = E. maximum Wartmann.

10. Pensacola, E. Triangelum Grunow Atl. 10, 54. (Gloionema Tr. E.).

11.12. St. Gallen, E. caespilosum K. var. 13. Baden b. Wien, E. ventricosum K. var.

14.15. Teppendorf in Schlesien, E. Lunula Grunow = Cymbella Lunula Rabenh.

16. Yarra Yarra (Grundl.), E. (? Yarrense A. S.

Ostindien, fraglich, ob zu E. caespitosum oder zu E. turgidum zu ziehen.

Carpentaria B. (Janisch), ebenfalls fraglich.

Lough Mourne Dep., Cocconema helvelicum = Cymb. helv. K.;

durfte indess von Atl. 10, 19 nicht zu trennen sein.

Zurich, nach Grunow C. Cistula var.; was mir unwahrschein-lich ist; ich mochte diese Form lieber mit Atl. 10, 18 verbinden.

21. Eilenburg, 22. Schönbrunn, C. Cistala var. maculata Grunow = Cymbella maculata K. (¹¹, O. **E**x.).

23-25. Spitzbergen, Cocconema arcticum = Cymb. arctica Lagerstedt.

26. Spitzbergen, Cymbella semicircularis Lagerst.
27. Dresden, Cocconema nanum Hantzsch O. Ex., nach Grunow's Ansicht = Cymbella affinis var.
28.29. Baden b. Wien, Cymbella affinis K.

30.31. Gerbersdorf in Schlesien, Encyonema ventricosum var. minuta

— Cymbella minuta Hilse.

32-34. Falaise, Encyonema Lunula (E.) Grunow = Cymbophora maculata Bréb.

35.36. Marly, Cymbella excisa Kg.

37.38. Platten See, Cocconema Fungarioum Granow.

39. Spitzbergen, Cymbella Botellus Lagerstedt. 40.41.

Demerara River, fraglich. 42. Sansego, halt Grunow fur eine Navicula; ich rechne sie zu den Cymbelleen. Die Grenzen zwischen Navicula und Cymbella sind freilich zur Zeit noch nicht überall scharf zu ziehen.

43. Ordie Dep., fraglich.

44.45. St. Gallen, Cymb. alpina Grunow; Riefen zart punktirt.

Rammer Moor, fraglich

Demerara River, fraglich. Logic Coldstone, 49. Loch Cammor, Cymb. Cesat.i Grenow; zeigt unter scharferen Objectiven eine feine Streifung.

Raasay Earth, Cymb. acqualis Sm. var. hybrida Grunow.

Demerara River

Ispahan, Cymb. amphicephala Naeg. var.

Airomanches?

54,55. Arromanches, Cymb. delicaiula K. var.

56-61. Aberdeen, Cymbella Beverteiana A. S. Grunow will diese Form zu N. serians rechnen, welche in dem betreffenden Materiale jedoch nicht vorkommt, aber auch viel feiner gestreift ist. Ich erkenne hier ganz deutlich den Unterschied einer Bauch- und Rückenseite; in der Mitte der Ruckenseite stehen die Riefen (vergl. besonders 58 und 60) weiter von cinander.

62.63. Spitzbergen, Cymb. stauroneiformis Lagersledt.
64-66. Tents Muir, Cymb. integra A. S. — Navicula integra W.
Sm. Die Riefen in der Mitte der Rückenseite weitläufiger; die Endknopfehen neigen sich etwas nach der Bauchseite (besonders deutlich an F. 66 zu sehen).

67.68. Pordoneg, Tirol, C.mb. austriaca Grunow. 69. Arpatscher Hochalpen, C;mb. austriaca var.

70.71. Salzburg, Cymb rep.cola Ganow.

72. Salzburg, Cymb. obiesa Greg. var. 73. Platten Sec, fraglich.

74. Rammer Moor, Cymb. Ehrenbergii var.

75-78. Dem rara River, Cymb. americana var. acuta A. S. ef. Atl. 9, 15, 2). — Cymbella Davidsonii Grunow in litt.

Khayenmathay, Cymb. bengalensis Granow. Puerto Montt, Cymb. Ebrenbergir var.

80.

S. Francisco, Cocconema Janschii A. S. S. Francisco, Cocconema mexicanum E. var.

#### Tafel 72.

1. Degenershausen, nahe b. Falkenstein im Harz, Navicula Semen E. im Regenerationsprocess.

2-7. Aschersleben, Gomphonema Mustela E. F. 6, Verkümmerungsformen im Beginn der Regeneration; in F. sicht man zwei der alten Schalen auf den regenerirten Exemplaren liegen; in diesen sind erst die äusseren Schalen fertig, während die Bildung der inneren noch nicht begonnen hat; F. 3 zeigt alle vier abgeplatzten Schalen auf den quergerunzelten Regene-rationshullen; F. 5 Schale eines regenerirten Ex.; F. 7 Ex. von mittlerer Grösse.

8.9. Aschersleben, eine Sphenella (die noch nicht bestimmt werden konnte) in Regeneration. Keines der massenhaft beobachteten Exemplare sass an einem Stiele; eine wirkliche Sphenella liegt uns also hier vor.

10. Alexisbad, Harz, Gomphonema acuminalum E. in Regeneration. 11. Gernrode, Cymbella ventricosa K.? in Regeneration.

12—14. (400:1) Aschersleben, Cymb. gastroides K. in Regeneration.

Bei F. 13 u. 14 sind nur die scharf abgegrenzten Gelatinhüllen gezeichnet, dagegen die äusseren Coconartigen Hullen weggelassen.

Bei F. 14 hat die Transfusion der Säfte erst eben begonnen; bei F. 12 ist sie schon etwas weiter vorgeschritten, wie die ovalen Gebilde

in der Mitte (vielleicht Anfange der Regenerationsschläuche) bezeugen; in F. 13 haben die neuen Schläuche die alten Schalen bereits gesprengt.

15-17. (660:1) Ballenstedt, Cocconema Cistula E. in Regeneration,

F. 16 in gleichem Stadium mit F. 12.; F. 15 zeigt, wie die sich regenerirenden Ex. möglichst viel Berührungspunkte mit einander suchen. In F. 17 ist die Regeneration bereits weiter vorgeschritten, als in F. 13. 18.19 sind nicht nach der Natur gezeichnet, sondern sollen nur

den Cymbelleen; 32. Rücken-, 33. Bauchseite.

anschaulich machen, wie sich nach meiner Vermuthung die Encyonemen in der Regeneration ancinander legen dürften.

20.21. Brocken, Encyonema gracile Rabenh., frisch gezeichnet. Jedes Ex. zeigte 2 aus kleinen Perlen zusammengesetzte längliche Gebilde (21° etwas stärker vergrossert) von blass-röthlich-grauer Färbung, welche fortwährend zitterton.

22. Ballenstedt, 23.24. Aschersleben, 25. Gernrode, Cocconema lancentatum E. Kudgedwam gang andere ele

lanceolatum E. Endochrom ganz anders, als bei den übrigen Cymbelleen!!

26-28. (400:1) Aschersleben, Cymbella gastroides K. lebendig. 26. rechte Seite, 27. Ruckenseite, 28. Bauchseite. 29-33. Aschersleben, Navicula dicephala Sm; Endochrom, wie bei

Den Regenerationsprocess des Gomphonema Musiela E. F. 2-7) habe ich im J. 1871 in tausenden von Fallen beobachtet und kann versichern, dass, was ich daruber mitzutheilen habe, durch keinen einzigen Ausnahmeitall abgeschwacht wurde.

Wenn die Gomphonemen in Folge ihrer Vermehrung durch Theilung den aussersten Grad von Verkummerung erreicht haben und die Nothwendigkeit gegen das Hinterende des andern zu liegen kommt.

Das ist nach meiner Ausicht eine Thatsache, welcher gegenüber von pflan licher Natur der Diatomaceen wohl nicht mehr geredet werden kann.

Daran sind aber auch einige Conjecturen von physiolog scher Wichtigkeit zu knupfen.

Die gleich den Gomphonemen an Stiefen sitzenden Cocconemen haben ein Vorder- und Hinterende, obgleich ein solcher Gegensatz an den Schalen noch leigen werden?

Die Encyonemen, deren Regeneration meines Wissens mich nicht bechachtet ist bedaschtet ist bedaschtet ist bedaschtet int den Bauchseiten aneinander

Die Encyonemen, deren Regeneration meines Wissens noch nicht beobachtet ist, haben oft sehr von einander abweichende Enden. Wenn sie in der Regeneration moglichst viel Berührungspunkte mit einander suchen, können sie sich nicht anders, als in der F. 18 und 19 augedeuteten Weise, also verkehrt, au ein-Bei vielen Naviculen, z. B. N. Bombais. N. Weisseldigni, N. Gründleri, N. didyma ist eine Schalenhalfte gar nicht selten viel stärker entwickelt, als die auch annehmen, dass die Naviculen überhaupt auf den Unterschied von Vorder- und Hinterende angelegt sind, auch wenn derselbe sich an ihren Schalen nicht nachweisen lasst,

nachweisen lasst,
Eine interessante Benhachtung aus d. J. 1871 habe ich leider vergessen auf Taf. 72 zur Anschauung zu bringen, die Regeneration von Meridion circulare,
dessen Ex. sich gleichfalls verkehrt gegen einander gelegt hatten.

### A. Schmidt's

## Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 69

(ausgegeben am 1. Juli 1876,

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigejägt ist, sind die Abbildungen durchweg 660jach vergrössert.

#### Verbesserter Abdruck.

Ausgegeben am 15. Marz 1887.



Plast, Thon v. Aggina (Ehrenbergs Material), Navicula Crabro E.

S. Monica, N. Crabro E. var.

Oran, N. Crabro E. var. Oranensis A. S.

Nankoori (Grunow), N. Crabro E. var. Nankoorensis Grunow.

5. Monterey (Grunow), N. ornata A. S.
6. Moron, N. expedita A. S.
7.8. Nord Celebes (Gründl.), N. expleta A. S.
9. Gaz, Exp., N. Dirrhombus A. S.

Gaz. Exp., fraglich.
 Camp. Bai, N. coarctata A. S. (das grosste bis jetzt aufgefundene Ex.

Funafuti (Gründler), N. limitanea A. S. var.? Sorrento, N. exemta A. S. var.?

14. Successful Bai, fraglich; zwischen 2 Rippen je eine emfache Rethe perlformiger Grübchen, bei anderer Einstellung erschemen statt dieser 2 Punktreihen.

15. Camp. Bai (Gründl.), N. Puella A. S. grössere Form.

16.17. Aegina, N. Beyrichiana A. S. Nach Grunows Mittheilung soll dies N. Williamsonii O'Meara sein; aber O'Meara's Abbildung (Ir. Diat. Pl. 33, f. 32 ist von der meinigen so total verschieden, dass ich nicht einmal eine ent fernte Verwandtschaft beider Formen anzunehmen wage. 18.19. Baldjik, N. moesta A. S., nachste Verwandte von N. bomboides A. S.

20. Gaz. Exp. Bestimmung vorbehalten. Auf den Riefen stehen zwischen den Langsrippen 2 Punktchen; daher in unserer Zeichnung die feinen Linien zwischen den Längsrippen.

21. Camp. Bai (Janisch), N. Chersonensis Grunow var. Camp. Bai (Janisch), N. splendida var. diplosticta Grunow. Wir haben hier die zu Atl. 13, 28, 29, gehorende Regenerations-

23. Sorrento, cf. Atl. 12, 48, fraglich.
24. Raised Marsch, N. interrupta var.
25. Yokohama, zu N. Puella A. S. zu rechnen.

- 26.27. Baldjik, N. digrediens A. S., verwandt mit N. divergens A. S.
- 28.29. Aegua, in verschiedener Einstellung gezeichnet, N. Bombus E. Das ware also die echte Ehrenbergsche Form dieser Art, welche aber keineswegs als deren naturlicher Typus zu betrachten ist; vielmehr erscheinen die ungewohn lich breiten, flaschenformigen Spaltrinnenleisten als Localeigenthumlichkeit.

30. Aegina, N. didyma E., grosses Ex and Annaherung an N. Kutzingii.

- Baldjik N. lineata Donkin var.
- Aegina, N. succincta A. S. var.? cf. A. S. Nordsce Diat. T. 2, F. 7. Yokohama, vielleicht zu N. vetula A. S. (Atl. 12, 49.) zu rechnen.

Santa Monica, N. demia A. S.
Cap. d. g. H., kritisch.
Rothes Meer, N. vana A. S., am nachsten mit N. futilis A S., (Atl. 13, 17) verwandt.
Japan, 38.39. Rio, Brasil, zunachst mit N. didym i K. verwandt.


Nord Celebes, nach Grunow's Vermuthung kleine Form v. N. exemia A. S., Atl. 11, 28, 29.

Aegina, N. Apis Donk., kleine Form.

**4**3.

Leton Bank, N. constricta Grunow var?
Carpentaria Bai, 44. Baldjik, N. Apis Donk. varr.
Californien, N. subnuda A. S. (Atl. 12, 44.) var. densestriata.





				••
		•		
			•	

### A. Schmidt's

## Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 70

(ausgegeben am 1. Juli 1876.)

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 660 jach vergrossert.

#### Verbesserter Abdruck.

Ausgegeben am 15. Marz 1887.



- Fig. 1-30 Gruppe derjenigen Naviculen, bei welchen der meistens fehlende Mittelkvoten darch an den Mittelporen der Spaltrinnen abgelagerte Wulste ersetzt wird.

  1-4. Northumberland, (F. 1-3 noch mit Mittelknoten) Navicula hyalina Donk. (sehr fein gestreift.
- 5. New Castle, N. hyalina Donk var.
  6. Camp. Bai, (sehr fein gestreift) N. pygmaea K. var.?
  7. Elmen b. Magdeburg, N. pygmaea K.

- Valparaiso, fraglich.
   Camp. Bai, N. bioculata Grunow.

- Camp. Bar, N. bioculata Grunow.
   Sansego, N. bioculata Grun. var.
   Java, 13. Cap. d. g. H., fraglich.
   Yokohama, 15. engl. Küste, 16. Camp. Bank, N. forcipata Grev. var. densestriata.
   Northumberland, N. forcipata Grev. kleine Form, (grossette Formen in A. S. Nordsee Diat. II., 16. 18.)
   Sölsvig, 19. 20. Sansego, N. forcipata Grev. var. versicolor Grunow.
   Nord Celebes, 22. Quarnero, dieselbe mit Statutol.

- 23-25. (24,25. dasselbe Ex. in verschiedenen Einstellungen gezeichnet) N. Reichardtii Grunow. 36. Golf v. Mexico, 27. 29. Java, 28. Camp. Bai, fragliche Formen.
- 30.31. Sansego, N. forcipata Grev. var. nummularioides Grunow.
  22. Nordsee, N. forcipata Grev. var. minor.
  33. Camp. Bai, wahrscheinl. sp. n.

- 34. Camp. Bank, N. forcipata var.?

- 35.36. Cap. d. g. H., (Atl. 8, 57) N. Nicobarica Grunow var.?

  37. Valparaiso, 38. Cap. d. g. H., nach Grunow N. nummularia Grev. var.

  39.40. Cap. d. g. H., wahrscheinl. sp. n.

  41. Samoa, N. Samoenis Grunow.

  42. Jamaia (Kitton), N. carinifera Grunow var. densius striata (cf. Atl. 2, 1, 2, 1, 2).
- 43. Leton Bank (Janisch), N. Schleinitzii Janisch, nach Grunow N. Hennedyi var.

- 44. Gaz. Exp., N. nebulosa Greg. var.
  45. St. Brieuc, N. Sandriana Grunow.
  46. S. Diego (Gründl.), N. O'Swaldii Janisch, nach Grunow N. excavata Grev. var. mesoleia (mit Stauros).
  47. Rothes Meer, N. Lyra E. var.
- Jamaica (Kitton), N. Caribaea Cleve (Atl. 2, 17).
- Gaz. Exp. (Weissfl.), N. proxima Janisch, (Riefen schwer zu erkennen.
- Samoa (Gründl.), N. clavata Greg.
- 51,52. Carpentaria B. (Janisch), N. bullata var. Mölleriana Janisch.
  53. Gaz. Exp., N. coffeiformis A. S. var. subcircularis.
  54. Jamaica (Kitton), N. coffeiformis A. S. var. densestriata.


- 55.56. Baldjik, N. sejuncta A. S. var. Baldjikiana.?
  57. Platten See, 58. Elmen, 59. Pensacola, fragliche Formen.
  60. Nordsee, N fraudulenta A. S. (cf. A. S. Nordsee Diat. III., 18., die Figur rechts), bisher für eine Cocconeis gehalten, aber es haben sich Exemplare mit beiden Schalen gefunden, deren jede mit Spaltrinnen versehen war.
  61. Camp. Bank. N. scintillans A. S.
  62. Staganger N. scutiformis Gennow

- 62. Stavanger, N. scutiformis Grunow.
  63. Quarnero, N. Ovulum Grunow.
  64. Camp. Bai (Grunow), 65. Gaz. Exp. (Weissfl.), N. Campylodiscus Grunow varr.
  66. Gaz. Exp., N. congrua Janisch.

- 67. Grip, Norwegen fraglich
  68. Cap. d. g. H., fraglich.
  69. Gaz. Exp. N. compar Janisch, (verwandt mit N. discrepans A. S. Atl. 8, 8.
  70. Gaz. Exp., N. munda Jan sch.

- 71. Leton Bank (Janisch), N. Eudoxia A. S. var. 72. Leton Bank (Janisch), N. pristiophora Janisch.
- Jamaica (Kitton), N. Grunovii Rabenh., forma minor. Moron (Janisch) sp. n.?

	-	
·		
•		
	•	



		•	

### A. Schmidt's

## Atlas der Diatomaceenkunde

### Tafel 71

(ausgegeben am 1. Juli 1876.)

Wo kerne besondere Angabe der Vergrosserung beigefrigt ist, sind die Abbildungen durchweg 660fach vergrossert.



#### Verbesserter Abdruck.

Ausgegeben am 15, Marz 1887.

1-5. Platten See, Schizonema facustre Ag., aus der Gruppe Pseudo Encyonema — Colletonema subcohaerens Thwaites, Encyonema Ungeri Grunos (Atl., 10, 63).

6-7. Platten See, Encyonema prostratum Raifs.

8.9. Muhlegg b. St. Gallen, Encyon. postratum var. - E. maximum Wartmann,

10. Pensacola, E. Triangulum Grunow Atl. 10, 54. (Glotonema Tr. E. .

11, 12. St. Gallen, E. caespitosum K. var. 13. Baden b. Wien, E. ventricosum K. var.

14.15. Teppendorf in Schlesien, E. Lunula Grunow — Cymbelli Lunula Rabenh, 16. Yarra Yarra (Grundl), E. (?) Yarrense A. S.

17. Ostindien, fraglich, ob za E. crespitosum oder zu E. turgidum zu ziehen.

18. Carpentaria B. (Janisch), ebenfulls fraglich

Lough Mourne Dep., Cocconema helveticum = Cymb. helv. K; dürfte indess von Atl. 10, 19 nicht zu trennen sein.

20. Zürich, nach Grunow C. Cistala var, was mir unwahrscheinlich ist; ich mochte diese Form lieber mit Atl. 10, 18 verbinden. 21. Eilenburg, 22. Schonbruum, C. Cistufa var. maculata Grunow — Cymbella maculata K. 21, O. Exp.

23-25. Spitzbergen, Cocconema arcticum - : Cymb. arctica Lagerstedt.

26. Spitzbergen, Cymbella semicircularis Lagerst.

27. Dresden, Cocconema nanum Hantzsch O. Ev., na h Grunow's Ansicht - Cymbella affinis var.

28.29. Baden b. Wien, Cymbella affinis K.

30.31. Gerbersdorf in Schlesien, Encycema ventricosum var. minuta = Cymbella minuta Hilse,

32-34. Falaise, Encyonema Lunula (É.) Grunow = Cymbophora maculata Bréb.

35.36. Marly, Cymbella excisa Kg.

37.38. Platten See, Cocconema Lungaricum Grunow.

39. Spitzbergen, Cymbella Bofellus Lagerstedt

40,41. Demerara River, fraglich. 42. Sansego, halt Grunow für eine Navicula; ich rechne sie zu den Cymbelleen. Die Grenzen zwis hen Navicula und Cymbella sind tierlich zur Zeit noch nicht überall scharf zu ziehen.

43. Ordie Dep., fraglich.

44.45. St. Gallen, Cymb. alpina Grunow; Riefen zart punktot.

46. Rammer Moor, fraglich. Demerara River, fraglich,

48. Logie Coldstone, 49. Loch Canmor, Cymb. Cesatii Grunow; zeigt unter schirferen Objectiven eine feine Streifung.

50. Raasay Earth, Cymb. aequalis Sm. var. hybrida Grunow.

Demerara River?

52. Ispahan, Cymb. amphicephala Naeg. var.

53. Arromanches?

54.55. Arromanches, Cymb. delicatula K. var. 56-61. Aberdeen, Cymbelia Beverleiana A. S. Grunow will diese Form zu N. serians rechnen, welche in dem betreffenden Materiale jedoch nicht vorkommt, aber auch viel feiner gestreift ist. Ich erkenne hier ganz deutlich den Unterschied einer Bauch- und Ruckenseite: in der Mitte der Ruckenseite stehen die Riefen (vergl, besonders 58 und

60) weiter von emander, 62,63. Spitzbergen, Cymb, stauro eiforms Lagerstedt.

Die Riefen in der Mitte der Ruckenseite weithoniger 64-66 Tents Muor, Cymb. integra A. S. = Navicula int gra W. Sm die Endknoptehen neigen sich etwas nach der Bauchseite (besonders deutlich an F. 66 zu sehen).

67.68. Pordoneg, Total, Cymb. a striaca Grucow.

69. Arpatscher Hochalpen, Cymb. austriaca var.

70.71. Salzburg, Cymb. rupicola Grunow.

72. Salzburg, Cymb. obtusa Greg. var.73. Platten See, fraglich.


74. Rammer Moor, Cymb. Ehrenbergii var.

75-78. Demerara River, Cymb. americana var. acuta A. S. cf. Atl. 9, 15, 20. = Cymbella Davidsonii Grunow in litt.

79. Khayenmathay, Cymb. bengalensis Grunow, 80. Puerto Montt, Cymb. Ebrenbergii var.

81. S. Francisco, Cocconema Janischii A. S. 82. S. Francisco, Cocconema mexicanum E. var.







### A. Schmidt's

## Atlas der Diatomaceenkunde

### Tafel 72

Gusgegeben am 1, Juli 1876.

Wo keine besondere Angabe der Vergrasserung beigejagt ist, sind die Abbildungen durchweg 660fach vergrassert.



#### Verbesserter Abdruck.

Ausgegeben am 15, Marz 1887,

- ラーチン・ファインでは、今十十分・

Degenershausen, nahe b. Falkenstein im Harz, Navicula Semen E. im Regenerationsprocess.

2-7. Aschersleben, Gomphonema Mustela E. F. G. Verkumm rungsformen im Beginn der Regeneration; in F. 2 st. ht. m.m. zwei 2-7. Aschersieben, compromena musicia E. F. 6. Verkumm rungstormen im beginn der negeneration, in F. 1 stim min zwei der alten Schalen auf den regenerirten Exemplicen hiezen, in diesen sind erst die ausseren 8 hal in bertig, während die Bildung der inneren noch nicht begonnen hit; F. 3 zeigt alle vier abgeplatzten Schilen auf den quergerunzelten Regenerationshallen; F. 5 Schale eines regenerirten Ex.; F. 7 Ex. von mitterer Grosse.

8.9. Aschersleben, eine Sphenella (die noch nicht bestimmt werden konnte in Regeneration. Keines der mass nhaft beobachteten Exemplare sass an einem Stole, eine wirkliche Sphenolla liegt uns also hier vor.

Alexisbad, Harz, Gomphonema acuminatum E in Regeneration.
 Gernrode, Cymbella ventricosa K. ? in Regeneration.

12-14. (400: 1 Aschersleben, Cymb. gastroides K. in Regeneration Ba F. 13 u. 14 sind nur die scharf abgegrenzten Gelatin hullen gezeichnet, dagegen die ausseren coconartigen Hullen weggelassen. Bei F. 14 hat die Transfision der Satte erst eben begonnen, bei F. 12 ist sie schon etwas weiter vorgeschritten, wie die oval n. Gebilde in der Mitte (vielleicht Aufange der Regenerationsschlauche) bezeugen; in F. 13 haben die neuen Schlauene die alten Schalen bereits gesprengt.

15-17. (660: 1) Ballenstedt, Cocconema Listula E. in Regeneration, F. 16 in gleichem Stadium mit F. 12.; F. 15 zeigt, who die sich regenerienden Ex. moglichst viel Berührungspunkte mit einander suchen. In F. 17 ist die Regeneration bereits weiter vorgeschriften, als in F. 13.

18.19 sind nicht nach der Natur gezeichnet, sondern sollen nur ans haulich michen, wie sich nach meiner Vermuthung die Encyonemen in der Regeneration anem under legen durften.

20.21. Brocken, Encyonema gracile Rabenh, frisch gezeichnet. Jedes Ex. zingte 2 aus kleinen Perlen zusammingesetzt langliche Gebilde (21) etwas starker vergrossert von blass-rothlich grauer Farbung, welche fortwalte id zitt iten.

23.21. Aschwedelten. 25. Gezonema lancentatum F. Endochrom ganz anders, als bei den abriegen 22. Ballenstedt, 23,24. Aschersleben, 25. Germode, Cocconema lanceolatum E. Endochrom ganz anders, als bei den ubrigen

Cymbellcen!! 26—28. (400: 1) Aschersleben, Cymbella gastroides K. lebendig, 26. in htt S. it., 27. Ruckenseite, 28. Bauchseite, 29—33. Aschersleben, Navicula dicephala Sm; Endochrom, wie bei den Cymbellem, 32. Rucken, 33. Bauchseite

Den Regenerationsprocess des Gomphonema Mustela E. (F. 2-7) habe ich im J. 1871 in Tausenden von Failen besom hitt und kann versichern, dass, was ich darüber mitzutheilen habe, durch keinen einz gen Ausnahmefall abgeschwacht wurde.

Wenn die Gomphonemen in Folge ihrer Vermehrung durch Theilung den aussersten Grad von Verkummerung einenhit

haben und die Nothwendigkert ihrer Regeneration eingetreten ist, verlassen sie ihre Stiele und legen sich verkehrt mit den Bauchseilen an einander, d. h. so. dass das Vorderende des einen Ex. gegen das Hinterende des andern zu liegen kommt.

Das ist nach meiner Ansicht eine Thatsache, welch eine gemüber von pflanzlicher Natur der Diatomiceen wohl nicht mehr


Daran sind aber auch einige Conjecturen von physiologischer Wechtigkeit zu knupfen.


Enden. Wenn sie in der Regeneration moglichst viel Berumungspankte mit einander suchen, konnen sie sich meht auters, als in der F. 18 und 19 angedeuteten Weise, also verkehrt an einander legen. Ihr schmachtigeres Ende durfte als Hinterende zu deuten sein.

Bei vielen Navieulen, z. B. N. Bombus, N. Werssilogn, N. Grundlert, N. didyma ist eine Schalenhuft einen nacht selten viel stärker entwickelt, als die and we. Vielleicht ist die um enige Richen Querciefen) stärker entwickelte Schalenhalte als Vorderende anzuschen. Wäre das begit idet, so besse sich wohl auch annehmen, dass die Naviculen überhaupt auf den Unterschied von Vorder- und Hinterende ang digt sind, auch wenn dieselbe sich an ihren Schalen nicht nachweisen lasst.

Eine interessante Beobachtung aus d. J. 1871 habe ich leider vergessen auf Taf. 72 zur Anschauung zu Uringen, die Regeneration von Meridian einzulang des in Regeneration von Meridian von Regeneration v

Regeneration von Meridion circulare, dessen Ex, sich gleichtalls verkehrt gegen einander gelegt hatten.







## ATLAS

DER

# DIATOMACEEN-KUNDE.

IN VERBINDUNG MIT DEN HERREN

### GRÜNDLER, GRUNOW, JANISCH UND WITT

73 Arachmaidiscus

14 Stichediscus

75 Threeratium

HERAUSGEGEBEN

VON

### ADOLF SCHMIDT,

ARCHIDIACONUS IN ASCHERSLEBEN.

HEFT.

ASCHERSLEBEN.

ERNST SCHLEGEUs VERLAG.



### Vorläufige Erläuterungen

### A. Schmidt's Atlas der Diatomaceenkunde Heft 19.

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 610fach vergrössert. (In Folge mangelhafter Instruction des Photographen ist die Bildflüche der Tafeln 73 bis 81 zu klein ausgefallen. Der Druck der Tafeln war leider bereits vollendet, als ich von diesem Versehen Kenntniss erhielt. Die folgenden Tafeln werden wieder den früheren entsprechen. A. S.)

(Ausgegeben am 28. Januar 1882.)

Bemerkung zu T. 68, Fig. 8. Wenn Fig. 7 Arachnoidiscus indicus E. ist, wird auch diese schöne, namentheh durch den doppelten Perlenkranz vor dem Rande ausgezeichnete, Form von Nankoori aus Grunow's Sammlung dahin zu rechnen sein.

### Tafel 73.

1. S. Francisco, Arachnoidiscus Ehrenbergii var. Californica A. S. 610/1, vergl. T. 68, 3. 4. Die eigenthümliche Gestalt der Radien (s. Bemerk. zu T. 68, 7) bestimmt mich, diese Form zu A. Ehrenbergii zu rechnen, während Grunow

meint, sie sei ziemlich = A. indieus E.

Monterey (vergl. T. 68, 6), A. indieus E. var.

Monterey (Weissfl.), vergl. T. 68, 5, A. Grevilleanus Hardm.

Grunow will f. 2 u. 3 zu A. Ehrenbergii var. evanescens ziehen. Aber diese Formen

haben ganz andere Rudien als A. Ehrenb. Wenn T. 68, 5 nicht als A. Grevilleanus anerkannt wird, habe ich überhaupt keine Ahnung davon, was diese Art sein soll.

- 4. Cap d. g. H. 5. Nankoori (Grunow), 6. Yokohama (Gründl.), A. ornatus E.
- 7-9. Monterey (Gründl.), A. ornatus var. Montereiana A. S.
- 10. Gazellen Exp. (Janisch), A. ornatus var.; nur das innere Gerüst der Schale ohne Oberschieht.

### Tafel 74.

- 1. Moron (Weissfl.), Stictodiscus californicus Grev. var. areolata
- 2.3. Nankoori (Grunow), St californicus var. Nankoorensis Grunow.
  4. Los Angelos 610/1, 5 ibid. 339/1 St. californicus Grev. typ.
  6.7. Monterey (Weissfl.), St. californicus var. ecostata Grunow.
  8. Monterey (Weissfl.), St. Hardmanianus Grev. forma minor.

9. Camp. Bai 339/1, 10 ibid. (Gründl.) 610/1, St. californicus var.
11. S. Francisco (Weissfl.), St. simplex A. S.
12. Zanzibar (Weissfl.), St. Argus A. S.
13.14.15. Monterey. Nach meiner festen Ueberzeugung innere 13. 14. 15. Monterey, Nach meiner testen Ochoczeog.... Schalenv. Stictodiscus. Solche innere Schalen, welche namentlich bei Asteromphalus und Asterolampra vielfach vorkommen und irrthümlich als besondere Arten benannt sind. sind leicht daran zu erkennen, dass sie theils einen Stich ins Violette haben, theils der feineren Sculptur ermangeln, überhaupt

rober gestaltet sind. Grunow bestimmt die vorliegenden Figuren als Schalen von Me-Iosira clavigera Grunow.

16-18. Nottingham, St. Kittonianus Grev. 19, 20. Mors, St. Morsianus A. S.

21. Camp Bai, fraglich.22.23. Barbadoes, Sprinfield, fraglich.

- 24. Springsield, 25. Simbirsk, Pseudostictodiscus angulatus Grunow varr.
- 26-30. Mors, Pseudost, angulatus Grunow, Grunow bemerkt dazu, die beiden Schalen seien nicht ganz gleich, die flachere habe keine Rippen, und immer in der Mitte einen rudimentaren Stachel, der in meinen Zeichnungen fehle: die Ecken etwas vorspringend, darum den Biddulphien sich nahernd.

### Tafel 75.

 Jérémic (Joynson), Triceratium multiplex Janisch?
 Jérémic (Joynson), 2ª Umriss desselben Ex. in schwacher Vergrösserung, Tr. Jeremianum A. S.

3. Aegina Tr. parallelum Grev.

4.5. Moron (Weissfl.), idem.

6. (Joynson), 7. (Weissfl.), beide von Nankoori, Tr. Eulensteinii Grunow.

Samoa (Weissfl.), Tr. Godeffroyi Grunow.

9. Barbadoes (Joynson), Tr. disciforme Grev.
10. Barbadoes, Springfield (Gründl.), Tr. Gründleri A. S.

11.12. Camp. Bai, 13. Monterey (Weissfl.), Tr. parallelum Grev. forma trigona.

14-16. Camp. Bai (Gründl.), Tr. Harrisonianum Nordm.?; geht allmählig in T. 74 f. 9. über.

Anmerkung. Das Genus Triceratium bedarf einer gründlichen Umarbeitung, welche Grunow in Aussicht stellt. Der-selbe wollte viele Figuren dieser Tafel vorläufig zu Pseudostictodiscus stellen. Für Pseudost angulatus war mir dieses neue Genus willkommen; allein Formen, wie T. 75, f. 1. 2. 6. 7. u. a. mochte ich, aus Furcht vor neuer Verwirrung, nicht mit T. 74 Fig. 24 verbinden; ich habe sie darum noch unter Triceratium belassen.

### Tafel 76.

Jeremie (Joynson), Triceratium adspersum A. S.

Barbadoes (Joynson), Tr. giganteum Grev. forma minor.

- Barbadoes (Joynson), war als Tr. margaritaceum bezeichnet,
- nach Grunow eher Tr. americanum Ralfs.

  Springfield, fraglich, nach Grunow vielleicht verwandt mit Tr. punctatum Br. und Tr. Reticulum E. Piscataway, Tr. obscurum Grev. forma minor.

Port Denison, Tr. separatum A. S.

7. Nottingham (Gründl.), Tr. interpunctatum Grunow, welches sehr variirt und zuweilen nahe an Tr. inelegans Grev. heran tritt.

Nottingham, Tr. secernendum A. S. 9. 10. Camp. Bai, Tr. sculptum Shadb.

11. Nottingham (Weissfl.), fraglich, 12. Camp. Bank (Gründl.), Tr. sculptum var.

Camp. Bai, Tr. jucatense Grunow.

- Camp. Bai, trockene Auftragung, die Tüpfel und Punkte in verschiedenen doch nahen Foken, Tr. parallelum, forma trigona.

  15. ohne Fundort (Weissfl.), 16. 17. Camp. Bai (Gründl.), idem.

18. Camp. Bai, von mir zu f. 16. 17, von Grunow zu f. 13

19.20. Japan (Weissfl.), Tr. punctatum Brightw.

21. Moron, Tr. nicobaricum Grunow var.? Nankoori (Weissfl.), Tr. nicobaricum Grunow.

23-25. S. Vincent, Austral., Tr. incisum A. S.
26. Nottingham (Gründl.), nach Grunow wahrscheinlich Tr. Reticulum E., das dem Tr. punctatum Br. sehr ähnlich sei, aber in der Mitte 1-3 kleine Stacheln habe.

Nottingham (Gründl.), nach Grunow Tr. condecorum Brightw. 27.

Nottingham (Gründl.), Tr. americanum Ralfs = Tr. Amblyoceros Brightw. nec E.

Japan (Weissfl.), nach Grunow's Ansicht Tr. arcticum Brightw. 28.

var. japonica minor (ef. T. 79, 12. 13.)

Nankoori (Weissfl.), Tr. parallelum var. Trigona parva.

Cap. d. g. H., Tr. sculptum Shadb. var.?

Cuxhaven, fraglich.

Nottingham (Gründl.), Tr. tesselatum Grev. var. 33.

34. Patuxet River (Fischer), Tr. Fischeri A. S.

### A. Schmidt's

## Atlas der Diatomaceenkunde

### Tafel 73.

(ausgegeben am 1 Juli 1876)

Wo keine besondere Angabe der Vergrosserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 660 jach vergrössert.

#### Verbesserter Abdruck.

Ausgegeben am 15. Marz 1887,

-----

- 1. S. Francisco, Arachnoidiscus Ehrenbergii var. Californica A. S. 660,1, vergl. T. 63, 3, 4. Die eigentheimliche Gestelt der Radien (s. Bemerk zu T. 68, 7) bestimmt mich, diese Form zu A. Ehrenbergn zu rechnen, wahrend Grunow mant,
- (s. Bemerk 2u T. 65, 7) bestimmt inten, diese Form 2u A. Eurenbergit zu recunen, wantend Grunow in intensie sei ziemlich = A. indicus E.

  2. Monterey (vergl. T. 68, 6), A. indicus E. var.


  3. Monterey (Weissfl.), vergl. T. 68, 5, A. Grevilleanus Hardm. Grunow will f 2 u. 3 zu A. Ehrenbergit var. evanescens ziehen.


  aber diese Formen haben ganz andere Radien als A. Ehrenb. Wenn T. 68, 5 nicht als A. Grevilleanus anerkannt wird, habe ich überhaupt keine Ahnung davon, was diese Ait sein soll.


  4. Cap d. g. H. 5. Nankoori (Grunow), 6. Yokohama (Grundl.), A. ornatus E.

  7-9. Monterey (Gründl.), A. ornatus var. Montereiana A. S.

  10. Gazellen Exp. (Janisch), A. ornatus var.; nur das innere Gerust der Schale ohne Oberschicht.







### A. Schmidt's

## Atlas der Diatomaceenkunde

Tafel 74.

(ausgegeben am 1. Juli 1876.)

🥟 Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigejögt ist, sind die Abbildungen durchweg 660fach vergrössert. 📆


#### Verbesserter Abdruck.


Ausgegeben am 15, Marz 1887,




- Moron (Weissfl.), Stictodiscus californicus Grev. var. areolata Grunow.

- Moron (Weissfl.), Sticodiscus californicus Grev. var. areolata Grunow.
   Nankoori (Grunow), St. californicus var. Nankoorensis Grunow.
   Los Angelos 660/1, 5 ibid, 365/1 St. californicus Grev. typ.
   Monterey (Weissfl.), St. californicus var. ecostata Grunow.
   Monterey (Weissfl.), St. Hardmanianus Grev. forma minor.
   Camp. Bai 365 1, 10 ibid. (Gründl.) 660/1, St. californicus var.
   S. Francisco (Weissfl.), St. Argus A. S.
   Zanzibar (Weissfl.), St. Argus A. S.
   Monterey. Nach meiner festen Ueberzeugung innere Schalen v. Sticlodiscus. Solche innere Schalen, welche namentlich bei Asteromphalus und Asterolampra vielfach vorkommen und irrthumlich als besondere Arten benannt sind, sind leicht daran zu erkennen, dass sie theils einen Stich ins Violette haben, theils der feineren Sculptur ermangeln, überhaupt roher gestaltet sind. Grunow bestimmt die vorliegenden Figuren als Schalen von Melosira clavigera Grunow.
   Nottingham, St. Kittonianus Grev.
   20. Mors, St. Morsianus A. S.
   Camp. Bai, fraglich.
   Springfield, 25. Simbirsk, Pseudostictodiscus angulatus Grunow varr.
   Springfield, 25. Simbirsk, Grunow. Grunow bemerkt dazu, die beiden Schalen seien nicht ganz gleich, die flachere habe keine Rippen, und immer in der Mitte einen rudumentaren Stachet, der in meinen Zeichnungen fehle: die Ecken etwas vorspringend, darum den Biddulphien sich nähernd.







### A. Schmidt's

## Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 75.

(ausgegeben am 1. Juli 1876.)

Wo keine besondere Angabe der Vergrößerung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 660fach vergrößert.



#### Verbesserter Abdruck.

Ausgegeben am 15. Marz 1887.




1. Jérémie (Joynson), Triceratium multiplex Janisch?


2. Jérémie (Joynson), 2ª Umriss desselben Ex in schwacher Vergiosseiung, Tr. leremianum A. S.

3. Aegina Tr. parallelum Grev.
4.5. Moron (Weissfl.), idem.
6. (Joynson), 7. (Weissfl.), beide von Nankoori, Tr. Eulensteinii Grunow.
8. Samoa (Weissfl.), Tr. Godeffroyi Grunow.

 Samoa (Weissil.), Ir. Godefroyl Grundw.
 Barbadoes (Joynson), Tr. disciforme Grev.
 Barbadoes, Springfield (Gründl.), Tr. Gründleri A. S.
 Camp. Bai, 13. Monterey (Weissfl.), Tr. parallelum Grev. forma trigona.
 Camp. Bai (Gründl.), Tr. Harrisonianum Norm.?; geht allmahlig in T. 74 f. 9. uber.
 Anmerkung. Das Genus Triceratium bedait einer grundlichen Umarbeitung, welche Grunow in Aussicht stellt. Der Anmerkung. Das Genus Triceratium bedait einer grundlichen Umarbeitung, welche Grunow in Aussicht stellt. Der selbe wollte viele Figuren dieser Tafel vorlaufig zu Pseudostictodiscus stellen. Fur Pseudost. angulatus war mir dieses neue Genus willkommen; allein Formen, wie T. 75, f. 1. 2. 6. 7. u. a. mochte ich, aus Furcht vor neuer Verwirrung, nicht mit T. 74 Fig. 24 verbinden; ich habe sie darum noch unter Triceratium belangen. ratium belassen.







### A. Schmidt's

## Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 76.

(ausgegeben am 1. Juli 1876.)

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 660/ach vergrössert.

#### Verbesserter Abdruck.

Ausgegeben am 15. Marz 1887.




- Jérémie (Joynson), Triceratium adspersum A. S.
- Barbadoes (Joynson), Tr. giganteum Grev. forma minor.
- Barbadoes (Joynson), war als Tr. margaritaceum bezeichnet, nach Grunow eher Tr. americanum Raffs. Springfield, fraglich, nach Grunow vielleicht verwandt mit Tr. punctatum Br. und Tr. Reticulum E.
- Piscataway, Tr. obscurum Grev. forma minor.
- Port Denison, Tr. separatum A. S. Nottingham (Gründl.), Tr. interpunctatum Grunow, welches sehr variirt und zuweilen nahe an Tr. inelegans Grev. heran tritt.
- 8. Nottingham, Tr. secernendum A. S.
  9.10. Camp. Bai, Tr. sculptum Shadb.
  11. Nottingham (Weisstl.), fraglich, 12. Camp. Bank (Gründl.), Tr. sculptum var.
  13. Camp. Bai, Tr. jucatense Grunow.

- Camp. Bai, Tr. jucatense Grunow.
   Camp. Bai, trockene Auftragung, die Tüpfel und Punkte in verschiedenen, doch nahen Foken, Tr. parallelum, forma trigona.
   ohne Fundort (Weissfl.), 16, 17, Camp. Bai (Gründl.), idem.
   Camp. Bai, von mir zu f. 16, 17, von Grunow zu f. 13 gezogen.
   Japan (Weissfl.), Tr. punctatum Brightw.
   Moron, Tr. nicobaricum Grunow var.?
   Nankoori (Weissfl.), Tr. nicobaricum Grunow.
   S. Vincent, Austral, Tr. incisum A. S.
   Nottingham (Gründl.), nach Grunow wahrscheinlich Tr. Reticulum E., das dem Tr. punctatum Br. sehr ahnlich sei, aber in der Mitte 1—3 kleine Stacheln habe.
   Nottingham (Gründl.), nach Grunow Tr. condecorum Brigthw.
   Nottingham (Gründl.), Tr. americanum Ralfs = Tr. Amblyoceros Brigthw. nec. E.
   Japan (Weissfl.), nach Grunow's Ansicht Tr. arcticum Brightw. var. japonica minor (cf. T. 79, 12, 13.)
   Nankoori (Weissfl.), Tr. parallelum var. trigona parva.

- Nankoori (Weissfl.), Tr. parallelum var. trigona parva.
- 31. Cap. d. g. H., Tr. sculptum Shadb. var.? 32. Cuxhaven, fraglich
- Nottingham (Gründl.), Tr tesselaium Grev. var.
- 34. Patuxet River (Fischer), Tr. Fischeri A. S.





# ATLAS

# DIATOMACEEN-KUNDE.

IN VERBINDUNG MIT DEN HERREN

### GRÜNDLER, GRUNOW, JANISCH UND WITT

No20

HERAUSGEGEBEN

Amphilelras, Trice ADOLF SCHMIDT,

ARCHIDIACONUS IN ASCHERSLEBEN.

HEFT.

ERNST SCHLEGEL'S VERLAG.



### A. Schmidt's Atlas der Diatomaceenkunde

#### Heft 20.

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 610fach vergrössert.

(Ausgegeben am 28. Januar 1882.)

#### Tafel 77.

1. Camp. Bai (Weissfl.), 312/1, 2. ibidem (Gründl.), 200/1; 2a u. 2b dasselbe Ex. 610/1, Triceratium Tabellarium Brightw. var. diplosticta Grunow.

3-5. Camp. Bai (Gründl.), 5. trockene Auftragung, 610/1; nach Grunow Tr. Tabellarium var. Ich wage nicht, diese Form mit der vorigen zu vereinigen, halte sie vielmehr fur eine sp. n.

6.7.9. Camp. Bai (Gründl.), 8. Golf v. Mexico (Weissfl.), Tr. venulosum Grev.

10-13. Simbirsk (Weissfl.), Tr. duplicatum A. S.; nach Grunow = Tr. Flos E.

14. Barbad., Cambr. Est. (Joynson), Tr. areolatum Grev. var. venosa Grunow.

15.16. Barbadoes (Joynson), Tr. Jensenianum Grunow.

Jérémie (Joynson), Tr. grave A. S.
Barbadoes (Joynson), Tr. turgidum A. S.
Barbadoes (Joynson), Tr. gratum A. S.
Barbadoes, Cambr. Est. (Joynson), Tr. amplexum A. S.

Barbadoes (Joynson), Tr. Solenoceros E. (Die Ecken sind

ganz flach, also sehr verschieden von Tri-

22-24. Barbad., Cambr. Est., Tr. brachiatum Brightw.

25-28. Barbad., Springfield, nach Grunow dreiseitige Formen von Tr. inconspicuum Grev.? Kommt aber in dem qu, Material schr häufig und zwar ausschliesslich dreiseitig vor, darf also doch wohl als besondere Art betrachtet werden.

29. Barbad., Cambr. Est. (Joynson), Varietät des vorigen? 30-32. Barbad., Springfield, Tr. Westianum Grev. 33. N. Celebes (Gründl.), Tr. zonulatum Grev. forma triangularis? 34. Sandw. Ins., 35. Aegina, 36. Java, 37. Singapore, Tr. zonulatum Grev. latum Grev.

N. Celebes, trocken, 39. ibidem, in Balsam (Gründl.), Tr. satum Grev. var.

N. Celebes, Tr. Celebense A. S.

Springfield (Gründl.), Tr. cruciforme A. S. wogegen Grunow protestirt; also fraglich.

#### Tafel 78.

- 1. Barbad. (Joynson), Triceratium tumidum Grev. var. costulata Grunow.
- Barbad. (Joynson), Tr. castellatum West. var. major.

- Barbad. (Joynson), Ir. castellatum west, var. major.
  Barbad., Springfield, Tr. insigne Grev. forma minor.
  Barbad., Springfield (Gründl.), Tr. Trifolium A. S.
  B. Camp. Bai (Weissfl. u. Gründl.), Tr. trisulcum Bailey.
  Aegina, 10. Camp. Bai, 11. Peru Guano, 12. Camp. Bank,
  13. Camp. Bai, 14-17. Guano, 18. Camp.
  Bai, Tr. alternans E. u. varr. (= Tr. varia-
- bile Brightw.)

  19. Mazatlan (Gründl.), 20. Camp. Bank (Weissfl.), kleinere Formen desselben.
- 21. S. Francisco (Janisch), Biddulphia reticulata Roper var.? 22. Yokohama (Gründl.), 23 dasselbe Ex. in tieferer Einstellung, kleinere Form der vorigen.
- 24, 25. Java (Gründl.), Tr. bicorne Cleve.
- 26. Camp. Bai (Weissfl.), 27. Java (Gründl.), Tr. dubium Brightw. abnorn
- 28-30. Java, Tr. dubium Brightw.
- Singapore, dasselbe?
- 32. Sandw. Ins., 33. Camp. Bai, 34. 35. Algon Bai, Tr. bullosum Witt. T. Dubium Bright Witt.
- 36, 38, Carpentaria Bai (Janisch), 37. Elephant Point (Grunow), Hydrosera triquetra Wallich (= Terpsinoe).

### Tafel 79.

Funafuti (Gründl.), Amphitetras Graeffeana Witt.

 Samon (Gründl.), Triceratium formosum Brightw.
 Samon (Gründl.), Tr. formosum var. pentagonalis? Nach Grunow's Mittheilung hat Tr. formosum ein gelockertes Centrum, aber in der Südsee kommen häufig auch Formen vor, deren Centrum von Maschen ausgefüllt ist.

Monterey (Grunow), 6. ibid. (Gründl.), Tr. arcticum Brightw.

var. californica Grunow.

- Kerguelen, Successfulbay (Janisch), Tr. antarcticum Janisch (= Tr. arcticum var. kergaelensis Grunow). 8. Nankoori (Grunow), Tr. quinquelobatum Grev., nach Grunow
- auch nur var. von Tr. arcticum.
- 9. Neu Seeland, ob mit Amphitetras Graeffeanazu verbinden?

10.11. Yokohama (Gründl.), Tr. arcticum var. Japonica Grunow.

12.13. Vancouver Ins. (Eulenst. Diat. sp. typ.), Tr. arcticum Brightw. 12. 12. Umrisse desselben in schwacher Vergrösserung.

14. N. Celebes (Gründl.), ich wage noch nicht zu entscheiden, ob diese Form mit der folgenden zu verbinden sei.

15. N. Celebes, Tr. Pardus A. S.

Aegina, fraglich; nach Grunow's Ansicht nahe verwandt mit Tr. punctatum Brightw. und Tr. Reticulum E.

17. Moron, nach Grunow vielleicht verwandt mit Amphitetras punctata Grev. Sehr ähnlich, aber grösser, ist Tr. guttatum Cleve Mscpt.

#### Tafel 80.

- 1. 2. Ohne Fundort, 3. Monterey (Weissfl.), 4. Cap d. g. H., Glyphodiscus stellatus Grev. Nach Grunow's Bemerkung stehen zwischen den Rippen feine Punktreihen, und bilden sie grösseren Ex. unregelmässige Maschen.
- 5. Ohne Fundort (Joynson), Auliscus speciosus A. S. Ich wollte diese schöne Form zu Glyphodiscus stellen, nehme aber auf Grunow's Rath um so lieber davon Abstand, als auch nach meiner Ansicht das Genus Glyphodiscus auf gar zu schwachen Füssen steht und besser mit Auliscus vereinigt wird.
- 6. Crescent City (Joynson), Glyphodiscus Grunowi A. S. Nach Grunow Gl. stellatus var. An dem letzte-ren habe ich constant nur 4 Processe wahrgenommen und möchte Gl. Grunovii aufrecht erhalten, bis die Uebergange von einem zum anderen nachgewiesen sind.
- Kar Nicobar (Weissil.), Gl. scintillans A. S.
- Simbirsk (Weissfl.), traglich.

- 9. Springfield (Weissfl.), 10. ibidem (Gründl.), nach Grunow Liostephania Rotula E. varr. Damit kann ich mich nicht einverstanden erklären, denn Liostephania Rot. gehört zu den inneren Schaalen, welche leicht an ihrem Stich in's Violette kenntlich sind. Diese beiden sind ganz entschieden äussere Schaalen mit scharf hervortretender Sculptur. Sehr interessante aber noch fragliche Formen.
- 11. Colon (Kitton), Lampriscus Kittoni A. S. Nach Grunow's Ansicht Triceratium gibbosum Bailey forma 7 oculata.
- 12. Sandw. Ins., Triceratium elongatum Grunow, forma oculis maximis praedita, früher von Grunow auf Tr. orbiculatum bezogen.
- 13. Honduras (Grunow), Tr. gibbosum Bailey var. ? oder sp. n.? 14. 15. Sandw. Ins., Tr. gibbosum var. excisa Grunow.

16. Samoa (Gründl.), Tr. geminum A. S.

17. Sandw. Ins., Tr. gibbosum var. crenulata Grunow. 18-20. Samoa (Gründl.), Tr. Shadboldtianum Grev. 21. Honduras (Grunow), Tr. gibbosum var. elongata Grunow.

### A. Schmidt's

# Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 77.

(ausgegeben am 1. Juli 1876.)

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigejagt ist, sind die Abbildungen durchweg burgach vergrössert.



#### Verbesserter Abdruck.

Ausgegeben am 15. Márz 1887,



- 1. Camp. Bai (Weissfl.), 340/1, 2. ibidem (Grundl.), 220/1; 2 u. 2 dasselbe Ex. 660/1, Triceratium Tabellarium Brightw. var.
- diplosticta Grunow. 3-5. Camp. Bai (Grundl.), 5. trockene Auftragung, 660 1; nach Grunow Tr. Tabellarium var. Ich wage nicht, diese Form mit

- 3-5. Camp. Bai (Grundl.), 5. trockene Auftragung, 660 1; nach Grunow Tr. Tabellarium var. Ich wage nicht, diese Form mit der vorigen zu vereinigen, halte sie vielnehr für eine sp. n.
  6.7.9. Camp. Bai (Gründl.), 8. Golf v. Mexico (Weisstl.), Tr. venulosum Grev.
  10-13. Simbirsk (Weissfl.), Tr. duplicatum A. S.; nach Grunow = Tr. Flos E.
  14. Barbad., Cambr. Est. (Joynson, Tr. areolatum Grev. var. venosa Grunow.
  15.16. Barbadoes (Joynson), Tr. Jersenianum Grunow.
  17. Jérémie (Joynson), Tr. grave A. S.
  18. Barbadoes (Joynson), Tr. turgidum A. S.
  19. Barbadoes (Joynson), Tr. gratum A. S.
  20. Barbadoes, Cambr. Est. (Joynson), Tr. amplexum A. S.
  21. Barbadoes (Joynson), Tr. Solenoceros E. (Die Ecken sind ginz flich, also sehr verschieden von Trinaeria.)
  22.24. Barbad., Cambr. Est., Tr. brachiatum Brigthw.
  25-28. Barbad., Springfield, nach Grunow dreiseitige Formen von Tr. inconspicuum Grev? Kommt aber in dem qu. Material sehr haufig und zwar ausschliesslich dreiseitig vor, darf also doch wohl als besondere Art betrachtet werden. haufig und zwar ausschliesslich dreiseitig vor, darf also doch wohl als besondere Art betrachtet werden.

  Barbad., Cambr. Est. (Joynson), Varietat des vorigen?

- 29. Barbad., Cambr. Est. (Joynson), Varietat des Vorigen?
  30-32. Barbad., Springfield, Tr. Westianum Grev.
  33. N. Celebes (Gründl.). Tr. zonulatum Grev. forma triangularis?
  34. Sandw. Ins., 35. Aegina, 36. Java, 37. Singapore, Tr. zonulatum Grev.
  38. N. Celebes, trocken, 39. ibidem, in Balsam (Gründl.), Tr. latum Grev. var.
  40. N. Celebes, Tr. Celebense A. S.
  41. Springfield (Gründl.), Tr. cruciforme A. S.
  42. " hielt ich für Tr. blanditum Grev., wogegen Grunow protestirt; also fraglich.

	•		
			N.
	•		
		•	

	•	

### A. Schmidt's

# Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 78.

(ausgegeben am 1. Juli 1876)

Wo keine besondere Angabe der Vergrosserung beigejigt ist, sind die Abbildungen durchweg 6601ach vergrössert. 🖜



#### Verbesserter Abdruck.

Ausgegeben am 15. Marz 1887,



- 1. Barbad. (Joynson), Triceratium tumidum Grev. var. costulata Grunow.

- Barbad. (Joynson), Tr. castellatum West. var. costulata Grunow.
   Barbad. (Joynson), Tr. castellatum West. var. major.
   Barbad., Springfield, Tr. insigne Grev. forma minor.
   Barbad., Springfield (Gründl.), Tr. Trifolium A. S.
   Camp. Bai (Weissfl. u. Gründl.), Tr. trisulcum Bailey.
   Aegina, 10. Camp. Bai, 11. Peru Guano, 12. Camp. Bink, 13. Camp. Bai, 14-17. Guano, 18. Camp. Bai, Tr. alternans E. u. varr. (= Tr. variabile Brightw.)
   Mazatlan (Gründl.), 20. Camp. Bank (Weissfl.), kleinere Formen desselben.
   S. Francisco (Janisch), Biddulphia reticulata Roper var.?
   Yokohama (Gründl.), 23. dasselbe Ex. in tief-rer Einstellung, kleinere Form der vorigen.
   Java (Gründl.), Tr. hicorne Cieve

- 24.25. Java (Gründl.), Tr. bicorne Cleve. 26. Camp. Bai (Weissfl.), 27. Java (Grundl.), Tr. dubium Brightw. abnorm.
- 28-30. Java, Tr. dubium Brightw.

- 31. Singapore, dasselbe?
  32. Sandw. Ins., 33. Camp. Bai, 34. 35. Algoa Bai, Tr. bullosum Witt.
  36.38. Carpentaria Bai (Janisch), 37. Elephant Point (Grunow), Hydrosera triquetra Wallich (= Terpsinoe).

		•		
			•	
			·	
	,			
_				
,			•	

	,	
,		,

### A. Schmidt's

# Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 79

(ausgegeben am 1. Juli 1876.)

Wo keine besondere Angabe der Vergrosserung beigejagt ist, sind die Abbildangen durchweg 660/ach vergrissert.

#### Verbesserter Abdruck.

Ausgegeben am 15. Marz 1887.



- Funafuti (Gründl.), Amphitetras Graeffeana Witt.
   Samoa (Grundl.), Triceratium formosum Brightw.
   Samoa (Gründl.), Tr. formosum var. pentagonalis? Nach Grunow's Mittheilung hat Tr. formosum ein geloekertes Centrum, aber in der Südsee kommen haufig auch Formen vor, deren Centrum von Maschen ausgefußt ist.
   Monterey (Grunow), 6. ibid. (Gründl.), Tr. arcticum Brightw. var. californica Grunow.
   Kerguelen, Successfulbay (Janisch), Tr. antarcticum Janisch
   Vankoori (Grunow), Tr. a singuelebatum Grav. nach Grunow anch nur var. von Tr. arcticum.

- Kerguelen, Successfulbay (Janisch), Tr. antarcticum Janisch
   Nankoori (Grunow), Tr. quinquelobatum Grev. nach Grunow auch nur var. von Tr. arcticum.
   Neu-Seeland, ob mit Amphitetras Graeffeana zu verbinden?
   10.11. Yokohama (Gründl.), Tr. arcticum var. Japonica Grunow.
   12.13. Vancouver Ins. (Eulenst Diat. sp. typ.), Tr. arcticum Brightw. 12<sup>4</sup>. 12<sup>5</sup>. Umrisse desselben in schwacher Vergrosserung.
   14. N. Celebes (Gründl.), ich wage noch nicht zu entscheiden, ob diese Form mit der folgenden zu verbinden sei.
   15. N. Celebes, Tr. Pardus A. S.
   16. Aegina, fraglich; nach Grunow's Ansicht nahe verwandt mit Tr. punctatum B ightw. und Tr. Reticulum E.
   17. Moron, nach Grunow vielleicht verwandt mit Amphitetras punctata Grev. Sehr ahnlich, aber grosser, ist Tr. guttatum Cleve Msent. Cleve Mscpt.

	•
•	
	•
•	
	N.
	•



### A. Schmidt's

# Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 80

(ausgegeben am 1. Juli 1876,

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 660pach vergrossert.



#### Verbesserter Abdruck.

Ausgegeben am 15. Marz 1887.



- 1.2. Ohne Fundort, 3. Monterey (Weissfl.), 4. Cap. d. g. H. Glyphodiscus stellatus Grev. Nach Grunow's Bemerkung stehen zwischen den Rippen feine Punktreihen, und bilden sie bei grosseren Ex. unregelmässige Maschen.
- 5. Ohne Fundort (Joynson), Auliscus speciosus A. S. Ich wollte diese schone Form zu Glyphodiscus stellen, nehme aber aut Grunow's Rath um so lieber davon Abstand, als auch nach meiner Ansicht das Genus Glyphodiscus auf gar zu schwachen Füssen steht und besser mit Auliscus vereinigt wird

  6. Crescent City (Joynson), Glyphodiscus Grunowi A. S. Nach Grunow Gl, stellatus var. An dem letzteren hibe ich constant nur 4 Processe wahrgenommen und möchte Gl. Grunowii aufrecht erhalten, bis die Vebergange von einem
- zum anderen nachgewiesen sind,


- Kar Nicobar (Weissfl.), Gl. scintillans A. S.
  Simbirsk (Weissfl.), fraglich.
  Springfield (Weissfl.), 10, ibidem (Gründl.), nach Grunow Liostephania Rotula E. varr. Damit kann ich mich nicht einverstanden erklären, denn Liostephania Rot. gehort zu den inneren Schaalen, welche leicht an ihrem Stich in Violette konntlich sind. Diese beiden sind ganzentschieden äussere Schaalen mit scharf nervortretender Verstehren erklaren, denn Biostephania Rot, genort zu den inneren Schaalen, welche leicht an ihrem Stich in's Violette kenntlich sind. Diese beiden sind ganzentschieden äussere Schaalen mit scharf nervortretender Sculptur. Sehr interessante aber noch fragliche Formen

  Colon (Kitton), Lampriscus Kittoni A. S. Nach Grunow's Ansicht Triceratium gibbosum Bailey forma 7 oculata.

  Sandw. Ins., Triceratium elongatum Grunow, forma oculis maximis praedita, fruher von Grunow auf Tr. orbiculatum bezogen.

- 12. Sandw, Ins., Triceratium elongatum Grunow, forma oculis ma 13. Honduras (Grunow), Tr. gibbosum Bailey var.? oder sp. n.? 14.15. Sandw, Ins., Tr. gibbosum var. excisa Grunow. 16. Samoa (Gründl), Tr. geminum A. S. 17. Sandw, Ins., Tr. gibbosum var. crenulata Grunow. 18-20. Samoa (Gründl.), Tr. Shadboldtianum Grev. 21. Honduras (Grunow), Tr. gibbosum var. elongata Grunow,







# ATLAS

DER

# DIATOMACEEN-KUNDE.

IN VERBINDUNG MIT DEN HERREN

GRÜNDLER, GRUNOW, JANISCH und WITT

. HERAUS G-EGEBEN

V O N


## ADOLF SCHMIDT,

ARCHIDIACONUS IN ASCHERSLEBEN.

HEFT 21/22.

ASCHERSLEBEN,

COMMISSIONS-VERLAG
VON LUDWIG SIEVER'S BUCHHANDLUNG.



# ATLAS

DER

# DIATOMACEEN-KUNDE.

IN VERBINDUNG MIT DEN HERREN

GRÜNDLER, GRUNOW, JANISCH und WITT

HERAUSGEGEBEN

V O N

## ADOLF SCHMIDT,


ARCHIDIACONUS IN ASCHERSLEBEN.

ZWEITE REVIDIRTE AUFLAGE.

HEFT 21/22.

### ASCHERSLEBEN,

COMMISSIONS VERLAG
VON LUDWIG SIEVER'S BUCHHANDLUNG.



### A. Schmidt's

# Atlas der Diatomaceenkunde **Tafel** 81.

(ausgegeben im Juli 1885.)

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 660fach vergrössert.


- Colon (Weissfl.), Triceratium parallelum Grev. var. Coloniensis Grunow. Balearen (Weissfl.), Tr. parallelum Grev. var. Balearica Grunow. Sancta Monica (Weissfl.) Tr. quadrangulare Grev.


- 3. Sancta Monica (Weissfi.) Tr. quadrangulare Grev.
  4. Tr. arcticum var. Californica Grunow forma tetragona; cf. T. 79, f 6.
  5. Sechellen Ins (Weissfi.), Tr. (latum Grev. var.?) dissimile Grunow.
  6. Gazellen Exp. (Janisch), Tr. punctatum Brightw., forma hexagona Grunow.
  7. Sechellen Ins. (Weissfl.), Tr. punctatum Brightw., forma pentagona Grunow.
  8. Barbadoes, Cambr. Est. (Weissfl.), Tr. Harrisonianum Norm. forma minuta.
  9. Tr. Harrisonianum Norm. var.
  10. Santa Monica (Weissfl.), Tr. receptum A. S., verwandt mit Tr. Shadboltii Bail. u. mit Tr. acceptum Grev.
  11. Ngucy, Ostküste v. Madagascar (Weissfl.), Tr. compar A. S.
  12. Gaz. Exp. Tr. Argus Janisch, O. E.
  13. Gaz. Exp. (Weissfl.), Tr. portuosum Janisch Tr. Eulensteinii Grunow var. inornata, cf. Tafel 75, f. 6. 7.

  Die Mittelrosette fehlt, auch liegen die Punktreihen in unserer Form enger.
  14. Gaz. Exp. (Janisch), Tr. multiplex Janisch, forma minor, cf. T. 75, f. 1.
  15. Sechellen Ins. (Weissfl.), Tr. Seychellense Grunow. Grunow vermisst in m. Zeichnung die Wölbung des Centrums.
  16. Santa Monica (Weissfl.), Tr. inelegans Grev. var.
  17. Barbadoes (Weissfl.), Tr. Harrisonianum Norm.
  18. Ngucy (Weissfl.), Tr. Madagascarense Grunow. Die schwachen Querbinden hatte ich übersehen, darum wird demächst ein 2, Ex. dieser Art abgebildet werden.
  19. Gaz. Exp. Tr. raalatum Janisch. O. E. feet Hard.

- demnächst ein 2. Ex. dieser Art abgebildet werden.

  19. Gaz. Exp. Tr. caelatum Janisch, O. E. fast flach.







### A. Schmidt's

# Atlas der Diatomaceenkunde

Tafel 82.


(ausgegeben im Juli 1885.)

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 660fach vergrössert.



1.3.4. Cuxhaven, Triceratium Favus E. typ.
2. - var. subconvexa.
5. plast. Thon v. Aegina, Tr. grande Brightw.?
6.7. St. Augustin, Florida, Eulenst Diat. typ. No. 127, Tr. fimbriatum Wallich.
8. schwächere Vergröss. 9. 660: 1, Patagonien Guano (Weissfl), Tr. Patagonicum A. S.
10. St. Vincent, Austr., 360: 1, daneben der Rand eines andern Ex. 12. 360: 1, 13. 660: 1, Nankoori (Gründl), c. untere Schalenschicht, Tr. Brookei Leuduger Fortmorel.
11. Nankoori (Grunow), nach Grunow's Ansicht Tr. Favus E. var. der Rand ganz anders, als bei Tr. Favus typ. 14.15. Gaz. Exped. (Weissfl.), Tr. Rubertsianum Grev. var. macracantha Grunow.







zu

### A. Schmidt's

# Atlas der Diatomaceenkunde

Tafel 83.

(ausgegeben im Juli 1885.)

F Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 660/ach vergrössert. 🖜



- 1. Gaz. Exp. Triceratium distinctum Janisch. Grunow meint, dasselbe sei schwerlich von seinem Tr. affine zu trennen.

- trennen.

  2.3. Samoa (Weissfl. u. Gründl.)

  5. Nord. Celebes (Gründl.), 360 : 1. } Tr. Robertsianum Grev.


  4. Nord Celebes (Gründl.), Tr. Robertsianum Grev. forma inermis.

  6. Japan (Weissfl.) 360 : 1; 7. Golf v. Mexico (Gründl.), 660 : 1; kleinere Formen v. Tr. Robertsianum Grev.

  8.9. Camp. Bank, 10. Japan, Tr. muricatum Brightw.

  11.12.13. Golf v. Mexico (Weissfl. u. Gründl.), 14. Camp. Bank, 15. 16. Camp. Bai (Gründl.), Tr. scitulum Brightw. Ob Tr. muricatum u. scitulum mehr sind, als kleine Formen v. Tr. Favus, ist noch genauer zu untersuchen.







## A. Schmidt's

# Atlas der Diatomaceenkunde Tafel 84.

(ausgegeben im Juli 1885.)

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 660 jach vergrössert.





- 1. Yokohama (Gründl.) Triceratium rivate A. S. Bemerkenswerth sind die kurzen aber derben Stacheln,
- welche von den Maschenecken aus sich schräg gegen den Rand richten.

  2.3. Gaz. Exp. (Gründl. und Weissfl.), Tr. cuspidatum lanisch: die Maschen halten bis gegen die Mitte die dem Rande parallele Richtung inne, was bei den vierseitigen Formen von Tr. Favus (f. 4) nicht der Fall ist; besonders aber der ganz eigenthumliche Rand lässt keine Vereinigung dieser Form mit Tr. Favus zu. Die feine Sculptur der unteren Schalenschicht, wie bei
- Nord Celebes (Gründl.), Tr. Favus E. var. quadrata Grunow.
   Singapore (Weissfl.), 6. Camp. Bank (Gründl.), Tr. scitulum Brightw., forma quadrata.

- Nord Celebes (Gründl.), Tr. Tripos Cleve, forma major.


  Nguey, Ostküste v. Madagascar (Weissfl.), Maschen fein punctirt, nach Grunow Biddulphia reticulata

  Roper, forma trigona, var. subspinosa.

  Auffassung nicht entgegen, denn die Javanischen Formen dieser Art sind meistens mit
- solchen Stacheln, zuweilen mit stärkeren, versehen

  10-12. Carpentaria Bai (Gründl.), (die Umrisszeichnung f. 12 nur 360 : 1), Tr. Gründleri A. S.; nach allen Seiten hin gleichmässig abgewölbt, von Tr. consimile Grunow nicht nur durch die anders gestalteten Processe, sondern namentlich durch das, wie bei Tr. Favus, wabenartige Arrangement der Maschen verschieden. Bei f. 13. 14, welche Grunow als sein Tr. consimile anerkennt, kommen häufig Partieen vor, in welchen die Maschen durch einfach sieh kreuzende
- Linien getrennt sind. 13 14. Camp. Bai (Gründl.), Tr. consimile Grunow; Schale massig gewolbt; in der Mitte der Maschen scheinbar kleine etwas leuchtende Wärzchen, vielleicht richtiger Vertiefungen), welche von zarten den Rändern der Maschen parallelen Linien umzogen sind. Letzere treten in f 13 zu stark hervor.
- 15.16. Java, Triceratienformen von Biddulphia reticulata Roper.
- 17. Yokohama (Gründl.), Tr. japonicum A. S.







### A. Schmidt's

# Atlas der Diatomaceenkunde

Tafel 85.

(ausgegeben im Juli 1885.)


mand of the contract of the co


Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 660fach vergrössert.



1.2. Colon (Weissfl.), (2, 360 : 1) Triceratium grande Brightw. var. septangulata Kitton.
3.4. Manilla (Weissfl.), (4, 360 : 1) Tr. Schmidtii Janisch, var. pustulata A. S. cf. T. 86, f. 1. 2.
5.6.7. Gaz Exped. (Janisch), Tr. Grunowii Janisch; die untere Schalenschicht tragt nach Janisch's Untersuchung mit homogen. Immersion die gleiche, nur etwas feinere Sculptur, wie die von Tr. Favus 8. Ngucy (Weissfl.) Biddulphia reticulata Roper forma trigona.







zu

## A. Schmidt's

# Atlas der Diatomaceenkunde


Tafel 86.

(ausgegeben im Juli 1885.)





- when you is some how -

Gaz, Exp. (2. nur 360 : 1), Triceratium Schmidtii Janisch, O. E.
 Jérémie (Joynson), (5. nur 360 : 1) Tr. grande Brightw. var. pentagona Grunow.
 ohne Fundort (Joynson), (7. geringe Vergr.) Tr. Strabo A. S.; wenn man die Maschen mit Augen vergleicht, so blicken die langgezogenen Randmaschen über den Rand, wahrend die dicht dahinter stehenden kleinen nach der Mitte zurückschielen.
 Orescent City (Joynson), (9. 10. geringe Vergr.), fraglich.
 Samoa (Weissfl.) (13. geringe Vergr.), Tr. grande Brightw. var. septangulata Kitton.



ger out it.





# A. Schmidt's


# Atlas der Diatomaceenkunde Tafel 87.

(ausgegeben im Juli 1885.)

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigejügt ist, sind die Abbildungen durchweg 600 jach vergrössert









## A. Schmidt's

# Atlas der Diatomaceenkunde Tafel 88.

(ausgegeben im Juli 1885.)


Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefägt ist, sind die Abbildungen durchweg 660 jach vergrössert.


- Barbadoes, Cambr. Est (Weissfl.), 2. 3. Barbadoes (Joynson), Entogonia Davyana Grev. Barbadoes (Joynson), E. venulosa Grev. var. ohne Fundort (Joynson), E. amabilis Grev. var? Barbadoes, Springf., E. marginata Grev.

  (Joynson), E. Abercrombieana Grev.

  (Joynson), E. Abercrombieana Grev.

  (Weissfl.), fraglich. 9. " (Weissfl.), fraglich.
  10. " (Joynson), Triceratium lineatum Grev.
  11. " 12. Barbadoes, Cambr. Est. (Joynson), Tr. venosum Brightw.
  13. Cap d. g. Hoffn. fraglich.
  14. Barbadoes (Weissfl.), Tr. uviferum A. S.
  15. " Tr. figuratum Grev.
  16. Barbadoes, Cambr. Est. (Weissfl.), Processe schr gehoben, Tr. castellatum West. var.
  17. Barbadoes, Cambr. Est. (Weissfl.), Processe schr hoch, Tr. tumidum Grev. var. constulata Grunow; scheint sich aber doch von T. 78, f. 1, erheblich zu unterscheiden.
  18.19. Schiff Gettysburg, Lat. 34, 25, Long. 69, 42 in 2924 Tiefe, (Weissfl.), Tr. abyssorum Grunow.







ZII

# A. Schmidt's

# Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 89

(ausgegeben am 1. Januar 1886)

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 660, ach vergrössert.



1.—4. gehören, wie T. 67, 1. 2. 3, zu den Auliscen mit kreuzförmiger Area.

1. Galapagos, Auliscus insignis Cleve, O E.

2. Santa Monica (Weissfl.), nach Grunow A. Biddulphia Kitton var. Von der nach einem O. E. entworfenen Abbildung
T. 67, 3 ist die vorliegende sehr abweichend; das gilt noch mehr von

T. 67, 3 ist die vorliegende sehr abweichend; das gilt noch mehr von

3. ebendaher, welche Grunow als A. Biddulphia var. (?) bestimmt.

4. Santa Monica (Weissfl). A. Hardmanianus Grev., ovale Var und mit von T. 67, 1 sehr abweichenden Processen.

5.6. ebendaher, A. pruinosus Bail. var. subreticulata Grunow. Trotz dem sehr abweichenden Aussehen sollen diese Formen in A. pruinosus übergehen Man vergl. mit diesen T. 31, 6, 7, 11, 13, 14, welche wir gleichfalls zu A. pruinosus stellten u. man wird ihre Abweichung von den hier dargestellten so erheblich finden, dass kaum etwas Gemeinsames ubrigbleibt

7. ebendaher, A. Grunovi A. S., (cf. T. 30, 14.), größere und deutlich punktirte Form.

8. ehendaher. A. Grunovi var. californica Grunow.

8. ebendaher, A. Grunovii var. californica Grunow.
9. ebendaher, A. textilis A. S. Ich gebe dieser Form, welche ich unter keine der mir bekannten stellen mag, einen Namen, weil sie bei der kritischen Bearbeitung dieses Chaos einen willkommenen Anhaltpunkt

bieten dürfte.

10. San Diego (Gründl.), 11. 12. 13. Santa Monica (Weissil., A. mirab lis Grev. Diese 4 Abbildungen veranschrulichen die Formentfaltung der Art während des Theilungsprocesses. F. 10 mig der jüngsten und grössten (der Regenerationsform) nahe stehen, wahrend 13 zu den durch lange fortgesetzto Theilung verkümmerten gehört, welche ich kurz als Altersverkümmerungen zu bezichnen pflege. lung verkümmerten gehört, welche ich kurz als Altersverkümmerungen zu bezichnen pflege.


14.15.16.17. ebendaher. 14 und 16 bestimmt Grunow als A. punctatus Bail, mit dem Bemerken, dass Bailey selbst diese Art für Var. von A. pruinosus erklart habe. Ich verbinde einerseits 14 u. 15, andererseits 16 und 17 miteinander, und enthalte mich vorläufig jedes weiteren Urtheils darüber.


18. S. Monica, 19. Balearen (Weisfl.), A. inserlus A. S. Benannt nur, weil sich diese Formen ohne Zwang meht mit den bekannten verbinden lassen. Ihren Platz möchte ich ihnen zwischen A. sculptus u. A. confluens anweisen. 19. besitzt Grunow auch von S. Monica genau so, aber ausserdem fein gestreift.

20. S. Monica (Weissfl.) Eupodiscus californicus Grun. forma bioculata (cf. van Heurck, CXVIII, 7.).

20. S. Monica (Weissfl.) Eupodiscus californicus Grun. forma bioculata (cf. van Heurek, CXVIII, 7.).







zli


## A. Schmidt's

# Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 90

(ausgegeben am 1. Januar 1886.)






1.2 Tegel v. Brünn (Thum) Actinoptychus Stella A. S.
3.4. Mergel v. Szent Peter in Ung., 5. Tegel von Brünn (Thum) A. Stella var. Thumil A. S.
6. Tegel v. Brünn (Thum) A. bifrons A. S. Die Benennung und andeuten, dass die die Processe tragenden Hauptfelder mit viel feinerer und engerer Seulptur bedeckt sind, als die Nebenfelder.

mit viel feinerer und engerer Seulptur bedeckt sind, als die Nebenfelder.

7. Tegel v. Brünn (Thum) A. Gründleri A. S. var.

Anmerkung. Die neuentdeckten Erden Mährens und Ungarns bieten in ausserordentlicher Formenfulle solche Actinoptychen mit sculpturlosen Flecken und Streifen, welche im Atlas bisher nur durch A. Gründleri A. S., A. Pfitzeri Gründl., A. Bolivianus Janisch u. A. excellens Schumann auf T. 1 u. 29 vertreten waren. Die Kritik wird grosse Mühe haben, in diesem verschwimmenden Formenchaos scharfe Artgrenzen zu ziehen. Um der durch ungenügende Abbildungen entstehenden Verwirung vorzubeugen, benenne ich die von mir mit unbedingter Treue gezeichneten Hauptformen, ohne mich in Conjecturen über deren Verhaltniss zu ähnlichen noch nicht selbst untersuchten einzulassen. Das hier Gesagte bezieht sich auch auf die folgende Tafel.





,		,	
			•
		•	

zli

# A. Schmidt's

# Atlas der Diatomaceenkunde

### Tafel 91

(ausgegeben am 1. Januar 1886)

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 660jach vergrössert






1. Szent Peter (Thum), Actinoptychus Clevei A. S.

2.3 ebendaher, A. intermedius A. S., steht etwa in der Mitte zwischen A. Stella und A. undulatus
4. S. Monica (Thum), A. Bismarckii A. S.

S. Monica (Thum), A. Bismarckii A. S.
 ebendaher, A. undulatus, forma maxima.
 Szent Peter (Thum), A. geminus A. S.
 ebendaher; ist möglicher Weise die andere zu Pyrgodiscus armatus Kitton (T. 92, 15, 16) gehorende Schale. Die untere Partie dieser Schale trägt keine Stacheln und ist demgemäss von anderer Sculptur; die mit je vier etwas höher und je vier etwas tiefer stehenden Stacheln besetzte Mitte überragt nur um Weniges die untere Partie der Schale.





### A. Schmidt's

# Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 92

(ausgegeben am 1. Januar 1886.)


Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 660fach vergrossert.



- 1. Tegel v. Brünn 660: 1 (Thum), Aulacodiscus Grunowii Cleve (?); von der Mitte bis gegen die Processe hin fast flach, der Rand
  - stark abgewölbt. Grunow bezweifelt die Richtigkeit der Bestimmung; A. Grunowi sei im Habitus dem A. angulatus ähnlich und zeige ein Netz undeutlicher Maschen, welches hier nur in der Mitte angedeutet sei.

    2. 390: 1, 3. die Mitte und 4. der Rand mit einem Processe 660: 1, Nottingham (Weissfl.). Die eingesenkte Mitte liegt mit dem Rande in gleichem Niveau, der helle Ring am höchsten; von den dunkelsten Bogenlinien an fällt die Schale nach dem Rande zu steil ab; die Pünktchen erscheinen bei stärkerer Vergrösserung wie helleuchtende Bläschen; die Processe stehen in dieser Form vom Rande weiter ab, als in f. 5. 6. Darum wage ich nicht sie mit Kungdiscus Rogensii zu verzinigen und lasse ihre Begennung noch offen Hehrigens hin ich ich nicht, sie mit Eupodiscus Rogersii zu vereinigen und lasse ihre Benennung noch offen. Uebrigens bin ich mit Grunow der Ansicht, dass f. 2-6 zu Aulacodiscus zu stellen sind.
- Nottingham (Weissfl), 390:1, Eupodiscus Rogersii Bailey."
   Irland 390:1, 8. die Mitte, 9. der Rand, 10. die untere Schalenschicht aus der Mitte und 11. ein Bruchstück des Randes mit aufsitzendem Process, von der Seite gesehen, 660:1. Eupodiscus Argus E. Durchsichtigere Formen dieser Art sollen nach Grunow's Versicherung der vor. Art gleichen; ich habe solche noch nicht gesehen.
   Maryland (Thum) 660:1, wohl mit T. 41, 12 identisch und wie diese F. wegen der kleineren vom Rande weiter entfernten Processe gewiss nicht mit Aulacod, margaritaceus zu combiniren.
   Nottingham (Praep. v. Thum in Janisch's S) 660:1. Stimmt mit keiner der auf T. 37 abgebildeten Formen von A. margaritaceus überein, wird aber mit A. Mölleri Grunow (T. 33, 14) als Var. mit etwas kleineren Zellen zu verbinden sein; von T. 35, 6 im Relief sehr verschieden.
   ohne Fundort (Joynson), nach Grunow der richtige und typische Aulacod. inflatus Grev. T. 35, 9 muss also etwas anderes sein, wo die Zellchen nicht frei stehen, sondern sich an einander legen und wo der Rand ganz anders gestaltet ist.
   Brünn (Präp. v. Thum in Janisch's S.) 660:1, Pyrgodiscus armatus Kitton, vergl. das zu T. 91, 8. Gesagte. 5.6. Nottingham (Weissfl), 390:1 "Eupodiscus Rogersii Bailey."







# ATLAS

DER

# DIATOMACEEN-KUNDE.

•

IN VERBINDUNG MIT DEN HERREN

GRÜNDLER, GRUNOW, JANISCH und WITT

HERAUSGEGEBEN

V 0 N


### ADOLF SCHMIDT,

ARCHIDIACONUS IN ASCHERSLEBEN.

HEFT 23.

#### ASCHERSLEBEN,

COMMISSIONS-VERLAG
VON LUDWIG SIEVER'S BUCHHANDLUNG.



## ATLAS

DER

# DIATOMACEEN-KUNDE.

IN VERBINDUNG MIT DEN.HERREN

GRÜNDLER, GRUNOW, JANISCH und WITT

HERAUSGEGEBEN

V 0 M

## ADOLF SCHMIDT,


ARCHIDIACONUS IN ASCHERSLEBEN.

ZWEITE REVIDIRTE AUFLAGE.

HEFT 23.

ASCHERSLEBEN,

COMMISSIONS-VERLAG
VON LUDWIG SIEVER'S BUCHHANDLUNG.



## ATLAS

DER

# DIATOMACEEN-KUNDE.

IN VERBINDUNG MIT DEN HERREN

GRÜNDLER, GRUNOW, JANISCH und WITT

HERAUSGEGEBEN

V O N


### ADOLF SCHMIDT,

ARCHIDIACONUS IN ASCHERSLEBEN.

HERRT 24.

ASCHERSLEBEN,

COMMISSIONS-VERLAG®
VON LUDWIG SIEVER'S BUCHHANDLUNG.



#### A. Schmidt's

## Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 93

(ausgegeben am I. Januar 1886)


Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigejngt ist, sind die Abbildungen durchweg 660jach vergrossert.





- Nottingham (Weissfl), Triceratium subrotundatum A. S.
   Brünn 390: 1, % 660: 1, Tr. Thumii A. S.
   bebendaher, 660: 1, schräg liegend, so dass man senkrecht auf den Process sicht, gehort vielleicht zu dem demnächst zu publicirenden Tr. Wittii A. S.
   Seychellen (Weissfl.), Tr. sublime A. S.
   ebendaher, fraglich; nach Grunow's Auffassung Tr. Favus var. heptagona.
   Maranhon (Weissfl.), Sculptur der unteren Schalenschicht sehr fein, wahrscheinlich 2seitige Form einer mit Tr. Favus verwandten Art, etwa zu T. 82, 10 zu rechnen.
   Ngucy, Ostküste v. Madagascar (Weissfl.). Grunow bemerkt dazu, dass diese Formen au Tr. megastomum E. ?) Brigthw. u. Tr. constans Grev. erinnern, dass sich aber bestimmtes darüber nicht sagen lasse, weil die Sculptur der unteren Schalenschicht nicht dargestellt sei.
- schicht, in welcher die radialen Livien stärker hervortreten. Fraglich, zunächst mit Tr. rivale A S. T.
- 9. Szent Peter? (Thum), wie es scheint, mit einer Photographie, welche Grunow von Dr. Pantoczek zur Begutachtung erhielt, identisch. Auch hier ist die radiale Streifung auffallender. Tr. Pantoczekii A. S.







#### A. Schmidt's

## Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 94

(ausgegeben am 1, Januar 1886.)

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigejagt ist, sind die Abhildungen durchweg 660fach vergrossert.



1,2.3, S. Monica (Weissfl.), Triceratium Montereyii Brightw.

1.2.3. S. Monica (Weisstl.), Friceratium Montereyii Brightw.
4. Westküste v. Centralamerica (Thum), Tr. uncinatum A. S. vielleicht, wie Grunow vermuthet, eine Hydrosera.
5. S. Monica (Weissfl.), Tr. validum Grunow (Tr. trisulcum var.?); kommt auch bei Panama vor; eine ahmliche Form zugleich mit Gürtelbandansicht aus dem mahr. Tegel bringt eines der nachsten Helte.
6. Barbadoes, New-Castle (Weissfl.), dem Tr. rotundatum Grev. ahmlich.
7. Barbadoes, Chalky Mount (Weissfl.), Tr. obesum Grev.
8. " " " " " " " " " " " Tr. plicatum Grunow. Die Mittelbänder liegen in tieferem Focus; deshalb ist deren Sculpture und die haber gelegenen Thala der

tur nicht punctirt, sondern maschig gezeichnet, wie sie erscheint, wenn man die hoher gelegenen Theile der Schale genau einstellt.

9. Flores, Sunda 1. (Weissfl.), Tr. zonulatum Grev. forma trigona.


10. Barbadoes, New Castle (Weissfl.), fraglich; mit Tr. Westianum Grev. (T. 77, 30-32) verwandt, aber ohne dessen scharf um-


grenzte Mittelrosette

11. Barbadoes, Chalky M. (Weissfl), Tr. umbilicatum Ralfs.
12. Barbadoes, New Castle (Weissfl), Tr. venosum Brightw., forma parva (T 88, 11, 12.).
13. Barbadoes, New Castle (Weissfl.), Tr. Frauenfeldii Grunow? (cf. van Heurek (X, 10.))
14. Fundort? (Thum) Tr. radiato-punctatum A. S., die etwas eingesenkte Mitte liegt mit den unbestummten Bandern in gleichem Niveau; chenso die Umgebungen der Mitte mit den Partien vor den Processen

Niveau; chenso die Umgebungen der Mitte mit den Partien vor den Processen

15. Gaz. Exp. (Weissfl), Tr. Madagascarense Grunow, zur Berichtigung von T. 81, 18, wo die Querbinden nicht hervortraten.
16. Gaz. Exp. No. 96 (Janisch), Tr. expressum Janisch. O. E.
17. Barbadoes, Chalky M. (Weissfl), Tr. foveatum Grunow, forma minor. 18. Ngucy (Weissfl.), Tr. Javanicum Cleve (Hydrosera triquetra Wallich var.?). Grunow vermisst an meiner Zeichnung die Andeutung eines Stachels in der einen Ecke des Mittelfeldes, welche man bei den Hyroseren und Terpsmoen stets wahrnehme.







#### A. Schmidt's

## Atlas der Diatomaceenkunde


#### Tafel 95


(ausgegeben am 1, Januar 1886.)

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 1960fach vergrossert.



- 1. 1a. Archangelsk, Triceratium Archangelskianum Witt.
  2—12. ebendaher, Tric. Weissii Grunow. 7. 8. 9. 10. rechnet Witt zu Tric venustum; ich stimme Grunow bei, der sie für Varie täten von Tric. Weissii hält. 6. ist eine abnorme Bildung derselben Art.
- 13. Simbirsk (Weissfl.), Tric. quinqueguttatum Grunow. 14. 14a. Archangelsk, der vor nahe verwandt, in der Güttelbandansicht jedoch abweichend
- 16. Simbirsk, wohl Altersverkümmerung von 14. 15. 15a. 17. 18. Archangelsk; ich möchte diese Formen sämmtlich zu Tr. Kinkerianum Witt stellen, wie denn auch der Autor 17 und 18 als deren Varietäten anerkennt.
- 19. Archangelsk, fraglich.
- 20. Archangelsk, nach Grunow dem Tr. praetenue Grev. ähnlich ; nach Witts Ansicht sp. n., welche ich jedoch voreilig nicht be nennen mag.
- 21. Archangelsk, Tr. fenestratum Witt, von welchem später ein besseres Bild gegeben werden soll.
- 22-26. bieten ein ausreichend nüancirtes Gesammtbild von einer in diesem Mat sehr häufig vorkommenden Art, die vor andern einen besonderen Namen verdient: Tr. curvato vittatum A. S. Wenn sie mit Tr. fenestratum vereinigt werden sollte, wofür Grunow und Witt stimmen, so könnte jenes nur als Varietät dieser aufgefasst werden. Aber Tr. fenestratum, das viel seltnere, ist neben ihr aufrecht zu erhalten, theils wegen seiner bedeutenderen Grösse, theils weil seine Querbinden breiter und nicht so gekrummt sind,
- 27. Simbirsk, fraglich.
- 28.—32. Archangelsk, von Witt unter Tr. cellulosum Grev., von Grunow unter Tr. Flos E gestellt. Ich enthalte mich des Urtheils darüber, weil mir beide Arten noch unbekannt sind, mache aber auf eine ganz eigenthümliche Erscheinung aufmerksam, dass nämlich die Querbinden dieser Form sich bäufig ganz aussergewohnlich verdicken von Grunow als Tr. Flos var. intermedia aufgefasst, weil diese Form sich zugleich meinem Tr. duplicatum nähere, welches sich von Tr. Flos durch spitzere Ecken und demgemäss durch schmalere Polster unterscheide.







### A. Schmidt's

## Atlas der Diatomaceenkunde

#### Tafel 96

(ausgegeben am 1. Januar 1886)

Wo keine besondere Angabe der Vergrösserung beigefügt ist, sind die Abbildungen durchweg 660 jach vergrössert.



- 1. Polierschiefer v. Archangelsk-Kurojedowo (Thum) Trinacria Willii A. S. ( Trin. Regina var. obtusa Witt). In diesem Ma terial kommt, wie es scheint. Trin. Regina Heiberg nicht vor; um Cementstein v. Tny finden sich beide neben einander, in einzelnen Ex. sich wohl etwas nahernd, aber ohne wirkliche Uebergange zu einander. Die an unserer Art um vieles kleineren Zellchen bilden viel zahlreichere nach dem Rande zu stärker abgekrummte Punktreihen; ihre Hörner sind schmächtiger. T. 97 wird ein mit schmalem Rande versehenes Ex. dieser Art, sowie ein Horn derselben darstellen, daneben noch 3 Ex. von Trin. Regina in verschiedenen Modificationen, um den Unterschied beider zur Evidenz zu erheben.

- 2. Mors, Trin. Heibergii Kitton.
  3. 4. 5. Mors, Trin. Regina Heiberg, mittelgross.
  6. 7. 8. Mors, Trin. excavata Heiberg, auch nur mittelgross.
  9. 10. Archangelsk. Das etwas schräg liegende Ex. 10. beweist, dass diese Form zu Triceratium zu rechnen ist und dass seine Arme durch eine seichte Einsenkung von der Mittelpartie abgegrenzt sind. Nahe verwandt mit Trie. Solenoceros, aber vielleicht doch sp. n.
- 11. Nottingham (Weissfl.), Triceratium Solenocros E.

  12. 13. Archangelsk. Beide gehören unzweifelhaft zusammen. Wenn 13 nicht bewiese, dass wir es hier mit einem echten Triceratium zu thun haben, kame man in Versuchung, 12 nnt 14 u. 16 ohne weiteres zu verbinden. Witt möchte 12 unter sein vielgestaltiges Tric. nobile stellen.
- 14—17. Archargelsk, Trinacria Aries ex. rec. A. S. Ursprünglich hatte Witt diese Form so benannt, dann sie als var. unter Trin. excavata gestellt, erklärt sich aber jetzt damit einverstanden, dass ich die erste Benennung restiture. Im Material von Mors und Thy habe ich keine Trin. Aries, in dem Simbirsk-Material keine Trin. excavata gefunden. Trin. Aries hat grossere Zellchen, es fehlen ihr die langgezogenen randständigen Zellen, auch ist sie bedeutend kleiner. T. 97 wird durch mehrere Abbildungen von Trin. excavata das Gesagte noch mehr kräftigen.
- 18. ebendaher, wahrscheinlich auch Trin. Aries.
- 19.-21. Archangelsk. Characteristische constant so wiederkehrende Form, welche zu Triceratium gehort und ohne Willkürsich
- 22. Simbirsk 23. Barbadoes, Cambr. 24. Barbadoes, New Castle. Nach Grunow's Auffassung ist 22 Trinacria subcapitata var. Siberica, 23. u 24. Trin subcapitata minor (?). Witt zicht 22 u. 24 zu Triceratium subcapitatum Grev., wahrend er in Bezug auf 23 in Zweifel ist. Vermuthlich gehören ein Paar meiner noch nicht publicirten Zeichnung hierher, nach welchen unsere Formen zu Triceratium zu stellen waren.

  25. Barbadoes, Springf. (Weissfl.) Triceratium capitatum Grev.

  26. Barbadoes (Joynson). Triceratium subcapitatum Grev.
- 26. Barbadoes (Joynson), Triceratium subcapitatum Grev.
- 27.—31. Barbadoes (Joynson, Weissfl. u. Gründl.) Triceratium coniferum Brightw. Grunow vermuthet, dass diese ausserordentlich variirenden Formen zu Trinacria gehören. Ein schräg liegendes Ex. würde auch hier die Genus-Frage leicht entscheiden.
- 32. Archangelsk, Trinacria Grevillei Witt.



